



Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen
Leefmilieu

DGGS Gezondheidszorg – Dienst Data- en
beleidsinformatie en dienst Psychosociale
gezondheidszorg



Voorkomen van ziektebeelden


in psychiatrische instellingen

2021


In dit rapport aangaande het voorkomen van ziektebeelden kan u een aantal kerncijfers terugvinden betreffende de voornaamste ziektebeelden die als belangrijkste hoofddiagnose werden geregistreerd in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) in het jaar 2021.

We stellen vast dat, in beide instellingstypes, de meest voorkomende reden van opname gerelateerd is aan alcoholafhankelijkheid, met name 12,95 % in PAAZ en 14,69 % in PZ.

TOP 10 GESTELDE GEDETAILLEERDE HOOFDDIAGNOSE IN PAAZ, 2021




TOP 10 GESTELDE GEDETAILLEERDE HOOFDDIAGNOSE IN PZ, 2021




Verder zien we in PAAZ dat de tweede en derde meest gestelde gedetailleerde hoofddiagnose respectievelijk een depressieve stoornis - niet anders omschreven (7,81%) en majeure depressieve stoornis, recurrent en ernstig zonder psychotische kenmerken (4,10%) gevolgd door een aanpassingsstoornis met depressieve gevoelens (3,88%) betreft. In PZ zien we op nummer twee en drie de gedetailleerde hoofddiagnose psychotische stoornis – niet anders omschreven (9,61%) en schizofrenie van het paranoïde type (5,72%). De verschillen tussen PZ en PAAZ in de top 10 meest voorkomende ziektebeelden kunnen we deels verklaren doordat verblijven in PAAZ vaak van kortere duur zijn dan in PZ en dat we in PZ vaker te maken hebben met meer ernstige ziektebeelden.



Er is een duidelijk verschil tussen de ziektebeelden bij kinderen en jongeren en deze bij volwassenen en ouderen. In het linkse overzicht worden de meest voorkomende ziektebeelden in PAAZ weergegeven. In het rechtse de meest voorkomende ziektebeelden in PZ.



In de jongste leeftijdsgroepen stellen we vast dat een concrete diagnose vaak nog uitgesteld wordt in beide type instellingen. Bij 4 tot 12-jarigen zien we bij meer dan een kwart van het aantal patiënten een hoofddiagnose m.b.t. autisme. Bij 13 tot 17-jarigen treden aanpassingsstoornissen en depressie meer naar de voorgrond. Bij volwassenen zijn de meest voorkomende diagnoses depressie en alcoholmisbruik.



Als we een vergelijking maken tussen de meest voorkomende ziektebeelden bij mannen en vrouwen stellen we vast dat bij mannen vaker een diagnose gerelateerd aan alcoholmisbruik (22,81 % in PAAZ en 19,77 % in PZ) wordt gesteld dan bij vrouwen (10,95 % in PAAZ en 12,24 % in PZ). Daarentegen wordt een depressie vaker gediagnosticeerd bij vrouwen (29,84 % in PAAZ en 20,45 % in PZ) dan bij mannen (18,65 % in PAAZ en 9,51 % in PZ).