



**Santé publique  
Sécurité de la Chaîne alimentaire  
Environnement**

DGGS Soins de santé - Service Data et  
Information stratégique et service  
des soins psychosociaux



# Prévalence des pathologies

## dans les établissements psychiatriques

2021

Le rapport sur la prévalence des pathologies présente un nombre de chiffres clés concernant les principales pathologies qui ont été enregistrées comme diagnostic principal dans les hôpitaux psychiatriques (HP) et dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux (SPHG) en 2021.


Nous constatons que dans les deux types d'institutions, le motif d'admission le plus fréquent est lié à la dépendance à l'alcool, à savoir 12,95 % en SPHG et 14,69 % en HP.



En outre, on observe dans les SPHG que les deuxième et troisième diagnostics principaux détaillés les plus fréquents concernent respectivement les troubles dépressifs – non autrement spécifié (7,81%) et les troubles dépressifs majeurs, récurrents et graves sans caractères psychotiques (4,10%) suivi des troubles de l'adaptation avec sentiments dépressifs (3,88%). Dans les HP, les deuxième et troisième diagnostics principaux détaillés concernent les troubles psychotiques - non autrement spécifié (9,61% ) et la schizophrénie, type paranoïde (5,72%). Les différences entre les HP et les SPHG dans le top 10 des pathologies les plus fréquentes peuvent s'expliquer en partie par le fait que les séjours en SPHG sont souvent de plus courte durée que ceux en HP, et qu'en HP on est souvent face à des pathologies plus graves.




Il existe une nette différence entre les pathologies qui touchent les enfants et adolescents et celles présentes chez les adultes et personnes âgées. Le schéma à gauche montre les troubles les plus fréquents en SPHG. Celui de droite présente les troubles les plus fréquents en HP.



Dans les groupes d'âge les plus jeunes, nous constatons qu'un diagnostic concret est souvent différé dans les deux types d'environnement. Chez les 4-12 ans, plus d'un quart des patients ont un diagnostic principal d'autisme. Chez les 13-17 ans, les troubles de

l'adaptation et la dépression apparaissent le plus fréquemment. Chez les adultes, les diagnostics les plus courants sont la dépression et l'abus d'alcool.



Si l'on compare les pathologies les plus fréquentes chez les hommes et chez les femmes, nous constatons que les troubles liés à l'alcool sont plus souvent diagnostiqués chez les hommes (22,81 % en SPHG et 19,77 % en HP) que chez les femmes (10,95 % en SPHG et 12,24 % en HP). En revanche, les troubles dépressifs sont plus souvent diagnostiqués chez les femmes (29,84 % en SPHG et 20,45 % en HP) que chez les hommes (18,65 % en SPHG et 9,51 % en HP).