Allergische Reaktionen einschließlich Anaphylaxie nach Impfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoffen

Stellen Sie sicher, dass eine angemessene medizinische Behandlung und Überwachung zur Bewältigung einer Anaphylaxie jederzeit verfügbar ist (z.B. Adrenalin)

Risikostratifizierung **vor der ersten Dosis**

NICHT IMPFEN

Vorgeschichte einer **diagnostizierten** allergischen Sofortreaktion jeglichen Schweregrades auf Polyethylenglykol [PEG] oder auf Polysorbat (aufgrund einer möglichen Kreuzüberempfindlichkeit mit dem Impfstoffbestandteil PEG)

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder gegen einen der Hilfsstoffe des mRNA-Impfstoffs*

Überweisung an einen Allergologen wird empfohlen

HOHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

DIE IMPFUNG DURCHFÜHREN, Genaue Nachbeobachtungszeit von **mindestens 30 Minuten vorzugsweise in einer Krankenhausumgebung**

Vorgeschichte anaphylaktischer Reaktionen (einschließlich idiopathischer Anaphylaxie)

Systemische Mastozytose
Impfung im Zentrum für Allergologie und Immunologie berücksichtigen

Anamnestisch bekannte allergische Sofortreaktion auf Impfstoffe:
Wenn Impfstoffe PEG/Polysorbat enthalten, sollte vor der Verabreichung eine Überweisung an einen Allergologen in Betracht gezogen werden

Unkontrolliertes Asthma

STANDARDVORKEHRUNGEN

DIE IMPFUNG DURCHFÜHREN
Genaue Nachbeobachtungszeit
von mindestens 15 Minuten

Allergische/Immunerkrankungen mit sehr geringem Risiko für die Impfung

Chronische Spontane Urtikaria
Atemwegsallergien
Atopischer Dermatitis
Kontrolliertes Asthma
Vorgeschichte von allergischen Sofortreaktionen (außer Anaphylaxie) auf Lebensmittel, Hautflügler, Latex, Arzneimittel, die kein PEG oder Polysorbat enthalten

Bei Symptomen einer sofortigen Überempfindlichkeit nach der ersten Dosis: Es wird dringend empfohlen, eine Blutentnahme (Tryptase und Komplementfaktor) zwischen 60-180 Minuten nach Auftreten der Symptome durchzuführen

* Liste der Hilfsstoffe: **Pfizer/ BioNTech – COMIRNATY®** ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315) ; 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159) ; 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC); Cholesterol; Potassium chloride; Potassium dihydrogen; phosphate Sodium chloride; Disodium phosphate dihydrate ; Sucrose - **Moderna – COVID-19 Vaccine Moderna**: Lipid SM-102; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC); 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG); Cholesterol ; Tromethamo; Tromethamol hydrochloride; Acetic acid ; Sodium acetate trihydrate ; Sucrose.

Pr. Vito Sabato, Tim De Cloet, Pr. Didier Ebo, Pr. Pierre Van Damme, Pr. Antoine Froidure (im Namen der BelSACI), Pr. Jean-Michel Dogné

Diese Fassung wurde von der NITAG-Impfung in ihrer Sitzung vom 21/01/2021 genehmigt

Allergische Reaktionen einschließlich Anaphylaxie nach Impfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoffen

Stellen Sie sicher, dass eine angemessene medizinische Behandlung und Überwachung zur Bewältigung einer Anaphylaxie jederzeit verfügbar ist (z.B. Adrenalin)

Risikostratifizierung **nach der ersten Dosis**

DIE ZWEITE DOSIS NICHT VERABREICHEN

Schwere allergische Reaktion (z. B. Anaphylaxie) nach einer früheren Dosis eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs oder eines seiner Bestandteile*

Negative Beurteilung durch einen Allergologen bei einem nicht-anaphylaktischen Ereignis

** Eine Allergieberatung wird empfohlen, um den Auslöser zu ermitteln und Empfehlungen für andere Impfstoffe einzuholen*

HOHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

DIE IMPFUNG DURCHFÜHREN, Genaue Nachbeobachtungszeit **von mindestens 30 Minuten vorzugsweise in einer Krankenhausumgebung**

Symptome, die typisch für eine sofortige Überempfindlichkeit sind und mehr als 6 Stunden nach der ersten Dosis auftreten

Patienten mit sofortiger nicht-anaphylaktischer Überempfindlichkeit: Allergieberatung und bei positiver Beurteilung

Im Falle einer nicht eindeutigen Beurteilung

Impfung in Allergologie-Immunologie-Zentrum in Erwägung ziehen

STANDARDVORKEHRUNGEN

DIE IMPFUNG DURCHFÜHREN
Genaue Nachbeobachtungszeit
von mindestens 15 Minuten

Keine Symptome

Symptome ohne Zusammenhang mit einer Überempfindlichkeit

(Große) lokale Reaktionen

Bei Symptomen einer sofortigen Überempfindlichkeit nach der ersten Dosis: Es wird dringend empfohlen, eine Blutentnahme (Tryptase und Komplementfaktor) zwischen 60-180 Minuten nach Auftreten der Symptome durchzuführen

Pr. Vito Sabato, Tim De Cloet, Pr. Didier Ebo, Pr. Pierre Van Damme, Pr. Antoine Froidure (im Namen der BelSACI), Pr. Jean-Michel Dogné

Diese Fassung wurde von der NITAG-Impfung in ihrer Sitzung vom 21/01/2021 genehmigt