

**ARRETE ROYAL du 29 AOUT 1997**  
**relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires**  
**composées ou contenant des plantes**  
**ou préparations de plantes**  
(M.B. 21.XI.1997)

*Modifications:*

A.M. 6 août 1999 (M.B. 11.XII.1999)  
A.M. 13 avril 2000 (M.B. 1.VII.2000, err. M.B. 14.XI.2000)  
A.R. 20 juillet 2000 (M.B. 30.VIII.2000, err. M.B. 8.III.2001)  
A.M. 18 décembre 2001 (M.B. 7.II.2002)  
A.M. 23 janvier 2002 (M.B. 7.II.2002)<sup>1</sup>  
A.R. 15 mai 2003 (M.B. 8.VII.2003)  
A.M. 28 février 2005 (M.B. 25.III.2005, éd. 2)  
A.R. 5 août 2006 (M.B. 10.X.2006, éd. 2)  
A.M. 13 juin 2007 (M.B. 28.VI.2007, éd. 2)  
A.R. 17 décembre 2008 (M.B. 23.XII.2008, err. M.B. 9.I.2009)  
A.R. 19 mars 2012 (M.B. 4.IV.2012)  
A.R. 24 avril 2014 (M.B. 28.V.2014)  
A.R. 24 janvier 2017 (M.B. 10.II.2017)  
A.R. 20 décembre 2020 (M.B. 19.I.2021)

*Traduction en langue allemande:*

- des arrêtés modificatifs du 13 avril 2000 au 28 février 2005: M.B. 14.IX.2005;  
- de l'arrêté modificatif du 5 août 2006: M.B. 7.II.2007;  
- de l'arrêté modificatif du 13 juin 2007: M.B. 19.VII.2007.  
- de la version consolidée du 24 janvier 2017 : M.B. 10.II.2017

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2, l'article 10, alinéa 1er, modifié par la loi du 9 février 1994, et l'article 11, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 16 novembre 1993;

Vu l'avis de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires, donné le 21 janvier 1996;

Considérant qu'il est satisfait aux formalités prescrites par la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, donné le 29 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 6 août 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que lors d'une action de contrôle par l'Inspection des Denrées alimentaires (après plainte du Secrétariat permanent à la Politique de Prévention) il est apparu que dans certains points de vente dénommés "smart shops" des produits sont présentés notamment sous les dénominations "écodrugs", "smart-pills", "energy drinks", "boissons stimulantes", ... dont certains sont préparés à base de plantes potentiellement toxiques. Ces produits sont susceptibles de nuire gravement la santé des consommateurs. Afin de pouvoir agir sur une base légale et de pouvoir interdire, saisir et détruire ces produits dangereux, le présent arrêté est nécessaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

**Art. 1er.** Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Plantes: les organismes vivants qui sont en mesure, par photosynthèse, de produire des substances organiques à partir de matières premières inorganiques, les plantes parasites et les champignons;

2° *Plantes dangereuses:* plantes impropre à la consommation humaine;

<sup>1</sup> Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux conditions visées à l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, mais aux conditions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être mises dans le commerce au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (= 20 février 2019).

3° *Préparation de plantes*: le résultat de toute manipulation qui modifie la plante ou partie de la plante pour servir à la consommation humaine, à l'exclusion des additifs;

4° *Forme prédosée*: les formes suivantes: les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;

5° *Arômes*: les substances définies à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires;

6° *Ministre*: le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions;

7° *Service*: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Environnement;

8° *Compléments alimentaires*: les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'une source concentrée d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique;

9° *substances des plantes*: substances actives des plantes, qui ont un effet nutritionnel ou physiologique, ou des marqueurs des plantes.

**Art. 2.** § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce en tant que denrées alimentaires ou composants incorporés à des denrées alimentaires, des plantes reprises dans la liste 1 des plantes dangereuses en annexe du présent arrêté.

§ 2. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce des préparations de plantes obtenues à partir de plantes mentionnées dans la liste 1 de l'annexe au présent arrêté en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires. Cette disposition n'est pas d'application pour la fabrication d'arômes.

Le Ministre peut fixer une liste des plantes qui peuvent être utilisées ou non pour la fabrication d'arômes;

Le Ministre ou son délégué peut donner des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1<sup>er</sup> lorsqu'il peut être prouvé à l'aide d'un dossier toxicologique et analytique que les préparations de plantes ne contiennent plus les caractéristiques ou substances toxiques des plantes dont les préparations des plantes sont obtenues ; il détermine les conditions de ces dérogations individuelles sur base d'avis de la Commission d'avis des préparations de plantes; ces conditions portent sur la composition des produits et sur les mentions à apposer dans leur étiquetage.

**Art. 3.** § 1er. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires:

a) des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;

b) des denrées alimentaires contenant des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;

c) des champignons séchés:

– autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 et 2 en annexe du présent arrêté, s'ils sont en entier;

– autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté, s'ils sont fractionnés;

d) des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté d'espèces différentes mélangés entre eux ou avec des champignons repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté;

e) des champignons, autres que frais, fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée;

f) des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté qui sont fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée, à l'exception des truffes et des morilles;

g) des champignons contenant des insectes, des parties d'insectes ou des débris d'insectes;

h) des champignons qui ne sont pas frais de telle manière qu'ils peuvent présenter un danger pour la santé.

§ 2. Le Ministre peut fixer une liste de champignons qui peuvent être utilisés ou non pour la fabrication d'arômes ou d'additifs.

**Art. 4.** § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté et qui répondent aux conditions et restrictions, si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément aux dispositions suivantes.

Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire ou via l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ([www.sante.belgique.be](http://www.sante.belgique.be)). Le dossier de notification doit comporter au moins les données suivantes :

1° la nature du produit;

- 2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative);
- 3° l'analyse nutritionnelle du produit, si en application, et des données qualitatives et quantitatives concernant les substances actives significatives connues ou des marqueurs, par unité et par portion journalière, la toxicité et la stabilité;
- 4° l'étiquetage du produit;
- 5° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du Service;
- 6° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable. (1)

§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui:

- 1° ne sont pas reprises dans la liste 2 et liste 3 en annexe du présent arrêté ou;
  - 2° sont reprises dans la liste 2 et liste 3 en annexe du présent arrêté mais qui ne répondent pas aux conditions et restrictions, si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément au § 1<sup>er</sup> du présent article.
- Le dossier de notification doit contenir les données du § 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup> alinéa ainsi que toutes les données nécessaires relatives à la nature, à la toxicité et aux quantités des substances actives les plus importantes, dans la mesure qu'elles sont connues et détectables.

§ 3. Dans le mois de la réception du dossier de notification visé aux §§ 1<sup>er</sup> et 2, le Service envoie un accusé de réception au requérant. L'accusé de réception comporte un numéro de notification. Ce numéro de notification doit être repris dans tout document commercial.

Dans l'accusé de réception, le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre autres pour adapter l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements.

§ 4. Sans préjudice de la législation sur les médicaments, le Ministre peut, en ce qui concerne les plantes marquées avec (\*) dans la liste 3 de l'annexe, déterminer des teneurs minimales et maximales en substances actives et marqueurs en vue de la fabrication et du commerce de ces plantes.

Les arrêtés y relatifs sont pris sur avis de la Commission d'avis des préparations de Plantes.

Le Ministre désigne les membres de cette Commission et fixe leurs rémunérations. La Commission est composée de représentants d'organismes intéressés à la recherche, à la fabrication, au commerce et au contrôle des plantes.

§ 5. Les dispositions des §§ 1<sup>er</sup> à 3 ne sont pas d'application:

- 1° aux épices mentionnées dans l'arrêté royal du 17 septembre 1968 relatif aux épices et produits à base d'épices;
- 2° à d'autres herbes aromatisantes qui sont apparemment destinées à être utilisées pour être ajoutées aux denrées alimentaires;
- 3° aux préparations de plantes sous forme concentrée ou déshydratée servant à la préparation de limonades, jus de fruits et jus de légumes et dont les espèces sont mentionnées dans l'article 7 § 2 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires;
- 4° au thé (*Camellia sinensis*), au café (espèces du genre *Coffea*) et aux tisanes en sachets.

§ 6. Le Ministre peut, après avis de la Commission visée au § 4, 2<sup>ième</sup> alinéa:

- 1° interdire que certaines plantes ou préparations de plantes soient mélangées entre elles;
- 2° réservier le commerce en certaines plantes et préparations de plantes, sous forme prédosée ou non, à la détention de diplômes ou attestations déterminés;
- 3° modifier les listes en annexe du présent arrêté;
- 4° en ce qui concerne les plantes dans la liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, établir des substances caractéristiques de la plante ou des catégories caractéristiques des substances de la plante.

**Art. 5.** § 1<sup>er</sup>. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes doit comporter les mentions suivantes:

- 1° la dénomination: «complément alimentaire»;
- 2° la portion recommandée à consommer chaque jour.

Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion à consommer chaque jour.

Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage;

- 3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour;

- 4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants;
- 5° une mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;
- 6° outre la dénomination, si elle existe, de la ou des plantes dans la langue de la région, le nom scientifique;
- 7° le nom des substances de plantes ou le nom des catégories de substances de plantes qui sont indiquées en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, ou une indication relative à la nature de ces substances de plantes;
- 8° la teneur en substances ou en catégorie de substances présentes des plantes, reprises en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté par portion recommandée dans l'étiquetage à consommer chaque jour.

§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce sous forme non préemballée des compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes.

§ 3. Les mentions, visés au § 1er, 8° doivent être des valeurs moyennes calculées sur base de l'analyse du produit.

**Art. 5bis.** Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des compléments alimentaires, il est interdit:

- 1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires;
- 2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.

**Art. 6.** Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions déterminées par le Ministre en application du présent arrêté sont à considérer comme déclarées nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

**Art. 7.** Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à la présence de certaines plantes dans les denrées alimentaires.

Les plantes, mentionnées ou non dans les listes de l'annexe, pour lesquelles la consommation humaine est jusqu'au 15 mai 1997 restée négligeable dans l'Union européenne, tombent sous l'application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

**Art. 8.** Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.

**Art. 9.** L'arrêté du Régent du 15 janvier 1946 relatif au commerce des champignons, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1980, est abrogé.

**Art. 10.** Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Actuellement l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (M.B. 29.XI.2011, éd. 1):

«Art. 10. § 1er. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue d'obtenir un numéro de notification comme supplément alimentaire, en application des arrêtés d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de 180 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.»

A payer au n° compte IBAN BE33 6790 0004 3446, BIC/SWIFT PCHQBEBB de  
**AFSCA - Recettes matières premières**  
**CA-Botanique - Food Safety Center**  
**Boulevard du Jardin botanique 55**  
**1000 Bruxelles**

ANNEXE à l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

Liste 1: Plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que ou dans les denrées alimentaires

Wetenschappelijke naam / Nom scientifique	Familie / Famille	Synoniemen/ Synonymes	Nederlandse naam / nom Néerlandais	Franse naam / nom Français	Beperkingen en afwijkingsvoorwaarden	Limites et conditions de dérogation
<i>Abrus precatorius</i> L.	Leguminosae		weesboontje	régisse d'amérique		
<i>Aconitum</i> spp.	Ranunculaceae		monnikskap	aconit		
<i>Actaea spicata</i> L.	Ranunculaceae		christoffelkruid	actée en épi		
<i>Adenium</i> spp.	Apocynaceae					
<i>Adonis</i> spp.	Ranunculaceae		voorraarsadonis	adonis du printemps		
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Apiaceae		hondspeterselie	petite ciguë		
<i>Agapanthus</i> spp.	Amaryllidaceae		afrikaanse lelie	agapanthe		
<i>Agrostemma githago</i> L.	Caryophyllaceae		bolderik	nielle des blés		
<i>Aletris farinosa</i> L.	Nartheciaceae					
<i>Aleurites</i> spp.	Euphorbiaceae		o.a. houtolieboom	aleurite, e.a. bancoulier		
<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.	Euphorbiaceae		kemiri, kukui	graine de lumbang, kukui, kemiri	Enkel niet-geraffineerde olie is toegelaten indien door ontledingsverslagen aangetoond werd dat de olie geen phorbolesters bevat en het gehalte aan eleostearinezuur lager is dan 1%	Seule l'huile non raffinée est autorisée s'il a été démontré par des rapports d'analyse que cette huile ne contient pas d'esters de phorbol et que la teneur en acide éléostéarique est inférieure à 1%.
<i>Alkanna</i> spp.	Boraginaceae		alkanna	orcanette		
<i>Amaryllis</i> spp.	Amaryllidaceae		amaryllis	amaryllis		
<i>Ammi majus</i> L.	Apiaceae		groot akkerscherm	grand ammi		
<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne	Anacyclus		duitse bertram	pyrèthre d'allemande		
<i>Anacyclus pyrethrum</i> (L.) Link.	Anacyclus		roomse bertram	pyrèthre d'afrique		
<i>Anadenanthera</i> spp.	Leguminosae					
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulaceae		guichelheil	mouron rouge des champs		

Anamirta cocculus (L.) Wight et Arn.	Menispermaceae		kokkelkorrelstruik	coque du levant		
Anchusa spp.	Boraginaceae		ossentong	buglosse		
Andromeda spp.	Ericaceae		lavendelhei	andromède		
Anemone spp.	Ranunculaceae		anemoon	anémone		
Galipea officinalis Hancock, Cusparia officinalis (Hancock.) Engl.		Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias	angusturaboom	angusture vraie		
Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. Coul.	Cactaceae	Anhalonium lewini Henning	peyote, peyotl	peyote, peyotl		
Annona spp.	Annonaceae		o.a. zuurzakboom	e.a. corossol, cœur de bœuf		
Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.	Moraceae		upas	ipo		
Aquilegia vulgaris L.	Ranunculaceae		wilde akelei	ancolie vulgaire		
Areca catechu L.	Arecaceae		areka, betelnootpalm	aréquier		
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.	Compositae	Chrysanthemum frutescens L.	struikmargriet	anthémis		
Arisaema spp.	Araceae		o.a. drakeraap	e.a. navet indien		
Aristolochia spp.	Aristolochiaceae		pijpbloem	aristoloche commune		
Arnica chamissonis Less.	Compositae		valkruid	arnica		
Arnica montana L.	Compositae		valkruid	arnica		
Artemisia annua L.	Compositae		zomeralsem	armoise annuelle		
Arum maculatum L.	Araceae		gevlekte aronskelk	arum tacheté, gouet tacheté		
Asarum canadense L.	Aristolochiaceae		Canadese mansoor	asaret du Canada		
Asarum europaeum L.	Aristolochiaceae		mansoor	asaret d'Europe		
Aspidosperma spp.	Apocynaceae					
Athyrium filix-femina (L.) Roth	Athyriaceae		wijfjesvaren	fougère femelle		
Atractylis gummifera (L.) Less.	Compositae			chardon à glu		
Atropa spp.	Solanaceae					
Aucuba japonica Thunb.	Garryaceae		broodboom	aucuba		
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.	Compositae	Eupatorium triplinerve Vahl				
Baccharis spp.	Compositae					
Baptisia spp.	Leguminosae		o.a. wilde indigo	e.a. indigo sauvage		
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb.	Iridaceae	Belamcanda chinensis (L.) DC.	luipaardbloem	fleur léopard		

Borago spp.	Boraginaceae		incl. bernagie	incl. bourrache	Enkel het gebruik van volgende plantendelen is toegelaten: zaad, bloem.  De bereidingen zijn enkel toegelaten in voedingsmiddelen indien door ontledingsverslagen kan aangetoond worden dat die bereidingen maximaal 4 µg/kg toxische pyrrolizidine alkaloïden bevatten.	Seule l'utilisation des parties suivantes de la plante est autorisée: graine, fleur.  Les préparations sont autorisées dans les denrées alimentaires seulement s'il peut être prouvé par des rapports d'analyse que la teneur en alcaloïdes de pyrrolizidine toxiques de ces préparations ne dépasse pas 4 µg/kg.
Brachyglottis spp.	Compositae					
Brayera anthelmintica Kunth	Rosaceae	<i>Hagenia abyssinica</i> (Bruce) J.F. Gmel.	kosoboom	kousso		
Brugmansia spp.	Solanaceae					
Brunfelsia spp.	Solanaceae					
Bryonia spp.	Cucurbitaceae		o.a. heggerank	bryone		
Buxus sempervirens L.	Buxaceae		palmboompje	buis commun		
Caladium spp.	Araceae			pédiveau		
Calea zacatechichi Schltl	Compositae		droomkruid	l'herbe rêveuse		
Calla palustris L.	Araceae		slangewortel	calla des marais		
Caltha palustris L.	Ranunculaceae		dotterbloem	souci d'eau, populage des marais		
Canarium indicum L.	Burseraceae		nanganoten	noix de nagaille		
Cannabis sativa L.	Cannabaceae		hennep	chanvre		
Caragana arborescens Lam.	Leguminosae		erwtenstruik	arbre aux pois		
Carlina spp.	Compositae					
Caryota spp.	Arecaceae			e.a. palmier céleri		
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl.	Celastraceae		qat	khat		
Catharanthus roseus (L.) G.Don.	Apocynaceae		roze maagdenpalm	pervenche de Madagascar		
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx.	Berberidaceae		blauwe zilverkaars	blue cohosh		
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L.Andersson	Rubiaceae	<i>Cephaelis acuminata</i> Karst., <i>Uragoga granatensis</i> Baill.	braakwortel	racine d'ipecá, ipéca du brésil		

		Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill., Cephaelis ipecacuanha (Brot.) Tussac				
Erysimum × cheiri (L.) Crantz	Brassicaceae	Cheiranthus x cheiri L.	muurbloem	giroflée des murailles, vélard		
Cestrum spp.	Solanaceae					
Ceterach officinarum DC.	Aspleniaceae				Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoon dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
Chamaelirium luteum (L.) A. Gray	Melanthiaceae		helonias	fausse unicorn		
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clements	Amaranthaceae	Chenopodium ambrosioides L.	welriekende ganzevoet	chénopode fausse-ambroise, thé-du-mexique		
Cibotium barometz (L.) J. Sm.	Dicksoniaceae				Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoon dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
Cicuta virosa L.	Apiaceae		waterscheerling	ciguë vireuse, ciguë aquatique		
Cineraria spp.	Compositae			cinéraire		
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.	Cucurbitaceae	Cucumis colocynthis L.	kolokwint	coloquinte officinale		
Clivia miniata (Lindl.) Bosse	Amaryllidaceae		clivia, sint-Jozefsbloem	fleur-lis de saint Joseph		
Clusia rosea Jacq.	Clusiaceae					
Cnidoscolus spp.	Euphorbiaceae					
Colchicum autumnale L.	Colchicaceae		herfsttijloos	colchique d'automne		
Colutea arborescens L.	Leguminosae		europees blazenstruik	baguenaudier commun, arbre à vessies		
Comandra spp.	Santalaceae					
Conium maculatum L.	Apiaceae		gevlekte scheerling	grande ciguë		
Convallaria majalis L.	Asparagaceae		lelietje-van-dalen, meiklokje	muguet		
Convolvulus arvensis L.	Convolvulaceae		akkerwinde	liseron des champs		
Convolvulus scammonia L.	Convolvulaceae		purgeerwinde	scammonée		

<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	Coriariaceae		looiersstruik	redoul		
<i>Coriaria thymifolia</i> Humb. et Bonpl.	Coriariaceae					
<i>Corydalis</i> spp.	Papaveraceae		helmbloem, o.a. holwortel	e.a. corydale creuse		
<i>Corydalis solidia</i> (L.) Clairv.	Papaveraceae	<i>Corydalis bulbosa</i> (L.) DC.	vingerhelmbloem	corydale solide, corydale à tubercule plein	Enkel het decoct van de wortelstok is toegelaten in voedingsmiddelen.	Seule la décoction du rhizome est autorisée dans les denrées alimentaires.
<i>Corynanthe</i> spp.	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Anacardiaceae				Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoon dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
<i>Cotoneaster</i> spp.	Rosaceae		dwergmispel	cotonéaster		
<i>Crinum asiaticum</i> L.	Amaryllidaceae		lelie	crinum d'asie		
<i>Crotalaria</i> spp.	Leguminosae					
<i>Croton</i> spp.	Euphorbiaceae					
<i>Cryptostegia</i> spp.	Apocynaceae					
<i>Cycas</i> spp.	Cycadaceae		cycaspalm, varenpalm	cycas		
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Poaceae		handjesgras	chiendent dactyle		
<i>Cynoglossum</i> spp.	Boraginaceae		hondstong	cynoglosse		
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Orchidaceae		vrouwenschoentje	sabot de vénus		
<i>Cytisus</i> spp.	Leguminosae					
<i>Dalechampia scandens</i> Jacq.	Euphorbiaceae			liane ortie		
<i>Daphne</i> spp.	Thymelaeaceae					
<i>Datura</i> spp.	Solanaceae					
<i>Delphinium</i> spp.	Ranunculaceae		ridderspoor	staphisaigre, dauphinelle		
<i>Derris</i> spp.	Leguminosae					
<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara		<i>Dicentra spectabilis</i> (L.) Lem.	gebroken hartje	cœur de marie, cœur de jeanette		
<i>Dichondra repens</i> J.R. Forst. et G. Forst.	Convolvulaceae			dichondra rampant		
<i>Dictamnus albus</i> L.	Rutaceae		vuurwerkplant, essenkruid	dictame blanc, fraxinelle		
<i>Dieffenbachia</i> spp.	Araceae		dieffenbachia	dieffenbachia		
<i>Digitalis</i> spp.	Plantaginaceae		vingerhoedskruid	digitale		
<i>Tamus communis</i> L.	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	spekwortel	tamier commun		

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.	Leguminosae		tonkabonen boom	fève de tonka		
Dirca palustris L.	Thymelaeaceae			dirca des marais		
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Dryopteridaceae		mannetjesvaren	fougère mâle		
Duboisia spp.	Solanaceae					
Durio zibethinus L.	Malvaceae		doerian	durian, durion		
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.	Cucurbitaceae		springkomkommer	concombre d'âne, momordique		
Echium spp.	Boraginaceae		o.a. slangekruid	e.a. vipérine		
Ephedra spp.	Ephedraceae		o.a. zeedruif	ephédra		
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.	Ranunculaceae		winterakoniet	eranthe d'hiver, hellébore d'hiver		
Erechtites spp.	Compositae					
Erythrina spp.	Brassicaceae		erythrina	erythrine		
Erythroxylum coca Lam.	Leguminosae		cocastruik	coca		
Euonymus atropurpureus Jacq.	Celastraceae		vuurkardinaalsmuts	fusain noir pourpré		
Euonymus europaeus L.	Celastraceae		wilde kardinaalsmuts	fusain d'europe		
Euphorbia spp.	Euphorbiaceae		o.a. wolfsmelk, kerstster	e.a. euphorbe panachée, poinsettia		
Tetradium ruticarpum (A.Juss.) T.G.Hartley	Rutaceae	Euodia ruticarpa (A. Juss.) Benth., Evodia ruticarpa (A.Juss.) Hook.f. & Thomson (A. Juss.) Benth				
Excoecaria agallocha L.	Euphorbiaceae					
Ficaria verna Huds.	Ranunculaceae	Ficaria renunculoïdes Monch.	speenkruid	renoncule ficaire, ficaire fausse-renoncule		
Forestiera spp.	Oleaceae					
Fritillaria imperialis L.	Liliaceae		keizerskroon	fritillaire impériale, couronne impériale		
Galanthus spp.	Amaryllidaceae		o.a. sneeuwklokje	e.a. perce-neige		
Galega officinalis L.	Leguminosae		galega	galéga, sainfoin d'Espagne	Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan galegine en peganine bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en galégine et péganine est déterminée.
Garcinia hanburyi Hook. f.	Clusiaceae					
Geissospermum spp.	Apocynaceae					
Gelsemium spp.	Gelsemiaceae			jasmin jaune		
Genista tinctoria L.	Leguminosae		verfbrem	genêt des teinturiers		

Glechoma hederacea L.	Lamiaceae		hondsdraf	lierre terrestre		
Globularia alypum L.	Plantaginaceae		drietandkogelbloem	globulaire turbitt		
Globularia vulgaris L.	Plantaginaceae		gewone kogelbloem	globulaire commune		
Gloriosa superba L.	Colchicaceae		prachtelelie			
Gratiola officinalis L.	Plantaginaceae		genadekruid	gratiale		
Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.	Leguminosae	Bandeiraea simplicifolia (DC.) Benth.	griffonia	griffonia		
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.	Hypericaceae	Haronga madagascariensis L. (Lam. ex Poir.) Choisy	haronga boom	guttier du gabon		
Heimia spp.	Lythraceae					
Heliotropium spp.	Boraginaceae		heliotroop, zonnewende	héliotrope		
Helleborus spp.	Ranunculaceae		nieskruid, o.a. kerstroos	hellébore, e.a. rose de noël		
Hepatica nobilis Mill.	Ranunculaceae		leverbloempje	anémone hépatique		
Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier	Apiaceae		reuzenberenklaauw	berce de caucase		
Hippomane mancinella L.	Euphorbiaceae		manchineel	mancenillier		
Homalomena spp.	Araceae					
Hura crepitans L.	Euphorbiaceae		zandkokerboom	arbre au diable, sablier blanc		
Hyacinthus orientalis L.	Asparagaceae		hyacint	jacinthe d'orient		
Hyoscyamus spp.	Solanaceae					
Ilex aquifolium L.	Aquifoliaceae		hulst	houx		
Illicium anisatum L.	Schisandraceae	Illicium religiosum Siebold et Zucc.	japanse steranijs	anis étoilé du japon		
Ipomoea spp.	Convolvulaceae		pronkwinde	ipomée		
Iris spp.	Iridaceae		o.a. lis	iris		
Jatropha curcas L.	Euphorbiaceae		purgeernoot	médecinier, pourghère		
Juglans nigra L.	Juglandaceae		zwarte walnoot	noyer noir		
Juniperus sabina L.	Cupressaceae		sabijnse jeneverbes	genévrier sabine		
Kalmia latifolia L.	Ericaceae		lepelboom	laurier de montagne		
Laburnum anagyroides Medik.	Leguminosae	Cytisus laburnum L.	gewone goudenregen	cytise faux ébénier		
Lactuca virosa L.	Compositae		gifsla	laitue vireuse		
Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville	Papaveraceae		creosootstruik	créosotier		
Leopoldia comosa (L.) Parl.	Asparagaceae	Muscari comosum (L.) Mill.	kuifhyacint	muscari à toupet		
Leucojum vernum L.	Amaryllidaceae		lenteklokje	nivéole de printemps		

<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Oleaceae		wilde liguster	troène commun		
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Plantaginaceae		vlasbekje	linaire commune	Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloïden bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
<i>Liriope</i> spp.	Asparagaceae					
<i>Lithospermum</i> spp.	Boraginaceae		o.a. parelzaad	e.a. grémil		
<i>Lobelia inflata</i> L.	Campanulaceae		gezwollen lobelia	lobélie enflée		
<i>Lonchocarpus</i> spp.	Leguminosae					
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoliaceae		tuinkamperfoelie	chèvrefeuille des jardins		
<i>Lupinus</i> spp.	Cactaceae		lupine	lupin	De planten Lupinus angustifolius L. en Lupinus albus L. zijn toegelaten in voedingsmiddelen indien aangetoond werd dat het zaad en het meel van de planten maximum 200 mg/kg totaal alkaloïden en geen anagyrine bevat.	Les plantes Lupinus angustifolius L. et Lupinus albus L. sont autorisées dans les denrées alimentaires s'il a été démontré que la graine et la farine de ces plantes ne contiennent pas plus de 200 mg/kg d'alcaloïdes totaux et ne contiennent pas d'anagyrine.
<i>Lycoris</i> spp.	Amaryllidaceae					
<i>Lyonia</i> spp.	Ericaceae					
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	Asparagaceae		dalkruid	maianthème à deux feuilles		
<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae		kamalaboom	kamala, rottière des teinturiers		
<i>Mandragora officinarum</i> L.	Solanaceae		alruin	mandragore officinale		
<i>Meconopsis</i> spp.	Papaveraceae		schijnpapaver			
<i>Menispermum canadense</i> L.	Menispermaceae		Canadees Maanzaad.	Ménisperme du Canada		
<i>Mercurialis annua</i> L.	Euphorbiaceae		tuinbingelkruid	mercuriale annuelle		
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Euphorbiaceae		bosbingelkruid	mercuriale vivace		
<i>Mesembryanthemum</i> spp.	Aizoaceae		o.a. middagbloe, ijskruid	e.a. ficoïde glaciale		
<i>Mimosa</i> spp.	Leguminosae			mimosa		
<i>Mosannonia depressa</i> (Baill.) Chatrou	Annonaceae	Guatteria gaumeri Greenm.	yumel	yumel		
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	Leguminosae	Dolichos pruriens L.			Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité

					hoeveelheden harmaan alkaloïden, levo-dopa en lectine bevat. Een analyse van de niet proteinogene aminozuren moet uitgevoerd worden.	detectable en alcaloïdes harmanes, lévo-dopa et lectine. Une analyse des acides aminés non protéinogènes doit être effectuée.
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Scrophulariaceae		Ngaio boom	Arbre Ngaio		
<i>Narcissus</i> spp.	Amaryllidaceae		witte narcis, dichtersnarcis	narcisse des poètes		
<i>Nerium</i> spp.	Apocynaceae		oleander	laurier-rose		
<i>Nicotiana</i> spp.	Solanaceae		o.a. tabak	tabac		
<i>Nigella damascena</i> L.	Ranunculaceae		juffertje-in-'t-groen	nigelle de damas		
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nymphaeaceae		witte waterlelie	nymphéa blanc		
<i>Nymphaea odorata</i> Ait.	Nymphaeaceae		geurende waterlelie	nymphéa odorants		
<i>Ochrosia</i> spp.	Apocynaceae					
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglossaceae		addertong	ophioglosse commun, ophioglosse vulgaire, langue de serpent, ophioglosse des alpes, herbe sans couture	Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoon dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
<i>Ornithogalum</i> spp.	Asparagaceae		vogelmelk	ornithogale		
<i>Orobanche</i> spp.	Orobanchaceae		bremraap	orobanche		
<i>Oxalis</i> spp.	Oxalidaceae		klaverzuring	oxalide, oxalis		
<i>Paeonia</i> spp.	Paeoniaceae		pioen	pivoine		
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papaveraceae		slaapbol, papaver, maankop	pavot officinal	Het zaad afkomstig van deze plant is toegelaten als "maanzaad" op bakkerijproducten.	La graine provenant de cette plante est autorisée en tant que "graine de pavot" sur les produits de la boulangerie
<i>Paris quadrifolia</i> L.	Melanthiaceae		eenbes	parisette		
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.)	Vitaceae		vijfbladige wingerd	vigne vierge		
<i>Pausinystalia johimbe</i> (K. Schum.) Pierre ex Beille	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
<i>Peganum harmala</i> L.	Nitrariaceae		harmala	harmal		
<i>Petasites</i> spp.	Compositae		hoefblad	pétasite		
<i>Petunia violacea</i> Lindl.	Solanaceae					
<i>Pfaffia</i> spp.	Amaranthaceae					
<i>Philodendron</i> spp.	Araceae					

<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	Leguminosae		calabarbonen	fèves de calabar		
<i>Phytolacca spp.</i>	Phytolaccaceae		karmozijnbes	phytolaque		
<i>Pieris formosa</i> (Wall.) D. Don	Ericaceae			Piérís andromède		
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don ex G. Don Murr.	Ericaceae			Andromède du Japon		
<i>Pilocarpus spp.</i>	Rutaceae					
<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb	Araceae		Driebladige pinellia	Pinellia	Afwijking kan toegestaan worden voor bereidingen van de gedroogde wortel.	Des dérogations peuvent être attribuées pour des préparations de la racine séchée.
<i>Piper methysticum</i> Forster f.	Piperaceae		kava, kawa	kava, kawa		
<i>Piscidia piscidula</i> (L.) Sarg.	Leguminosae	Piscidia erythrina (Loefl.) L.	piscidia	piscidie		
<i>Podophyllum peltatum</i> L.	Berberidaceae		Voetblad, eendevoot	podophyllée pelté		
<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	Leguminosae		driebladcitrus	oranger trifolié		
<i>Psoralea spp.</i>	Rubiaceae					
<i>Psychotria viridis</i> Ruiz. et Pav.	Dennstaedtiaceae		Chacruna	Sami Ruca		
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Olacaceae		adelaarsvaren	fougère-aigle		
<i>Ptychopetalum spp.</i>	Ericaceae					
<i>Pyrularia pubera</i> Michx.	Santalaceae		buffelnoot			
<i>Quassia spp.</i>	Simaroubaceae					
<i>Quillaja saponaria</i> Molina.	Quillajaceae		zeephoutboom	bois de panama, quillaia		
<i>Ranunculus spp.</i>	Ranunculaceae		boterbloem	renoncule		
<i>Rauvolfia spp.</i>	Apocynaceae					
<i>Rhododendron spp.</i>	Ericaceae		rododendron	rhododendron		
<i>Rhodomyrtus spp.</i>	Myrtaceae					
<i>Rhus spp.</i>	Anacardiaceae		sumak	sumac		
<i>Rhus aromatica</i> Aiton	Anacardiaceae		welriekende sumac	rhus aromatique	Enkel het gebruik van kleine niet-concentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae		sumak	sumac, sumac des corroyeurs, vinaigrer	Enkel het gebruik van kleine niet-concentreerde hoeveelheden van de	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.

					vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	
Rhus glabra L.	Anacardiaceae		gladde sumak	sumac à bois glabre	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
Rhynchosia spp.	Leguminosae					
Richardia scabra L.	Rubiaceae		valse ipecacuanha	faux ipéca		
Ricinus communis L.	Euphorbiaceae		wonderboom	ricin commun		
Rivina humilis L.	Phytolaccaceae					
Roemeria hybrida L. DC.	Papaveraceae					
Rubia tinctorum L.	Rubiaceae		meekrap	garance des teinturiers		
Ruta spp.	Rutaceae					
Salvia divinorum Epling & Játiva	Lamiaceae		centraal amerikaanse salie	sauge des aztèques		
Sanguinaria canadensis L.	Papaveraceae		bloedwortel	sanguinaire du canada		
Sansevieria spp.	Asparagaceae		vrouwentongen	sansevière		
Santalum album L.	Santalaceae		sandelboom	Santal blanc, sandal		
Sassafras albidum (Nutt.) Nees	Lauraceae	Sassafras officinale T. Nees & C.H. Eberm.	sassafrashout	bois de sassafras		
Saussurea spp.	Compositae					
Schefflera spp.	Araliaceae					
Schinus molle L.	Anacardiaceae		peruviaanse peperboom	faux poivrier	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
Schinus terebinthifolius Raddi.	Anacardiaceae		braziliaanse peperboom	baies roses, poivre rose	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A.Gray	Melanthiaceae	Sabadilla officinalis (Schltdl. & Cham.) Standl. Brandt. et Ratzeb.	sabadilkruid	cévadille		
Scindapsus spp.	Araceae					
Scopolia spp.	Solanaceae					
Scrophularia spp.	Scrophulariaceae		helmkruid	scrofulaire		

<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	Lamiaceae		Baikalglidkruid	Scutellaire du lac Baikal	Het gebruik van de wortel afkomstig van deze plant is toegelaten in voedingsmiddelen.	L'utilisation de la racine provenant de cette plante est autorisée dans les denrées alimentaires.
<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	Lamiaceae				Het gebruik van de hele plant is toegelaten indien met analyse aangetoond werd dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden furano neoclerodanen bevat en door een botanisch certificaat werd aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'utilisation de la plante entière est autorisée s'il a été démontré par des rapports d'analyse que la préparation ne contient aucune quantité détectable en furano néo-clérodanes et si par certificat botanique il a été démontré que les parties utilisées proviennent de cette plante.
<i>Scutellaria</i> spp.	Lamiaceae		blauw glidkruid	scutellaire toque		
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Leguminosae	<i>Coronilla varia</i> L.	bont kroonkruid	coronille bigarrée		
<i>Senecio</i> spp.	Compositae		kruiskruid	sénéçon		
<i>Sesbania</i> spp.	Leguminosae					
<i>Sida cordifolia</i> L.	Malvaceae		bala	bala		
<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvaceae					
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae					
<i>Solandra grandiflora</i> Sw.	Solanaceae			liane trompette		
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	zwarte nachtschade	morelle noire		
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Solanaceae		bitterzoet	douce-amère, morelle douce-amère		
<i>Solenostemma argel</i> (Delile) Hayne	Apocynaceae					
<i>Sorbus domestica</i> L.	Rosaceae		peervormigelijsterbes	cormier, sorbier domestique		
<i>Spartium junceum</i> L.	Leguminosae		spaanse brem	genêt d'espagne		
<i>Spathiphyllum</i> spp.	Araceae					
<i>Spigelia anthelmia</i> L.	Loganiaceae			spigérie vermifuge		
<i>Spigelia marilandica</i> (L.) L.	Loganiaceae					
<i>Sprekelia</i> spp.	Amaryllidaceae		goudlelie	e.a. croix de saint-jacques		
<i>Stephanotis</i> spp.	Apocynaceae		bruidsbloem	jasmin de madagascar		
<i>Sternbergia</i> spp.	Amaryllidaceae					
<i>Strophanthus</i> spp.	Apocynaceae					
<i>Strychnos</i> spp.	Loganiaceae					

Symporicarpos albus (L.) S.F.Blake	Caprifoliaceae		sneeuwbes	symphorine		
Sympytum spp.	Boraginaceae		smeerwortel	consoude		
Tabebuia spp.	Bignoniaceae					
Tabernanthe iboga Baill.	Apocynaceae		ibogo	iboga		
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip	Compositae	Chrysanthemum cinerariifolium (Trevir) Vis.	dalmatisch vlooienkruid	pyrèthre		
Taxus spp.	Taxaceae		taxus	if		
Tephrosia spp.	Leguminosae					
Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast.	Cupressaceae	Callitris quadrivalvis Vent. Callitris quadrivalvis Rich. & A.Rich.	sandarak, kamercipres	sandaraque, thuja de Barbarie		
Teucrium chamaedrys L.	Rutaceae		echte gamander	germandrée petit-chêne		
Teucrium polium L.	Lamiaceae			germandrée tomenteuse		
Thevetia spp.	Lamiaceae		o.a. gele oleander	e.a. laurier-rose jaune		
Thuja occidentalis L.	Apocynaceae		westerse levensboom	thuya d' occident		
Trichocereus spp.	Cactaceae					
Trichodesma incanum Bunge	Boraginaceae					
Trollius europaeus L.	Ranunculaceae		europese trollius	trolle d' europe		
Tulipa spp.	Liliaceae		tulp	tulipe		
Turbina corymbosa (L.) Raf.	Convolvulaceae					
Tussilago spp.	Compositae		klein hoefblad	tussilage		
Tylophora asthmatica Wight et Arn.	Apocynaceae			asmatica, faux-ipcea		
Urginea spp.	Asparagaceae		zeeajuin	scille maritime		
Veratrum spp.	Melanthiaceae		nieswortel	vératre		
Viburnum prunifolium L.	Adoxaceae		amerikaanse sneeuwbal	viorne à feuilles de prunier		
Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Apocynaceae	Vincetoxicum officinale Moench	witte engbloem	dompte-venin		
Wikstroemia spp.	Thymelaeaceae					
Wisteria floribunda (Willd.) DC.	Leguminosae		japanse blauwregen	glycine du japon		
Wisteria sinensis (Sims) Sweet.	Leguminosae		chinese blauwregen	glycine de chine		
Xysmalobium undulatum (L.) R. Br.	Apocynaceae		uzara	uzara		

Zanthoxylum acanthopodium DC.	Rutaceae				Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloïden bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zanthoxylum americanum Mill.	Rutaceae				Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloïden bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zanthoxylum armatum DC.	Rutaceae	Zanthoxylum alatum Roxb.	geelhout	zanthoxyle	Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloïden bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zigadenus spp.	Melanthiaceae		alkaligras	cannash		

## Liste 2: Champignons comestibles

### Partie 1: Champignons comestibles cultivés

Nom scientifique Wetenschappelijke naam	Famille Familie	Synoniem Synonyme	Nom néerlandais Nederlandse naam	Nom français Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
<i>Agaricus arvensis</i> Sch.: Fr.	Agaricaceae		Anijschampignon	Agaric des jachères		
<i>Agaricus bisporus</i> (Lange) Sing. var. <i>Albidus</i> (Lange) Sing.	Agaricaceae		Gekweekte champignon	Agaric bispore, Champignon de Paris, variété blanche		
<i>Agaricus bisporus</i> (Lange) Sing. var. <i>Avellanuss</i> Lange) Sing.	Agaricaceae		Kastanjechampignon	Agaric bispore, Champignon de (Paris, variété blonde)		
<i>Agaricus bitorquis</i> (Quélet) Saccardo	Agaricaceae		Straatchampignon	Psalliote des trottoirs		
<i>Agaricus campestris</i> L.: Fr.	Agaricaceae		Weidechampignon	Agaric des jachères		
<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.) Peck	Agaricaceae		Slanke anijschampignon	Agaric sylvicole		
<i>Agaricus subrufescens</i> Peck	Agaricaceae	<i>Agaricus blazei</i> Murill	Amandelpaddenstoel	Agaric auguste		
<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.: Fr.) Maire	Bolbitiaceae		Populierleemhoed	Pholiote du Peuplier, Pivoulade		
<i>Boletus aereus</i> Bull. ex Fr.	Boletaceae		Bronskleurig eekhoorntjesbrood	Cèpe bronzé, Tête-de-nègre		
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.	Boletaceae	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	Vroeg eekhoorntjesbrood	Cèpe d'été		
<i>Boletus rex-veris</i> D. Arora & Simonini	Boletaceae			Cèpe Roi du printemps		
<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.) Pers.	Agaricaceae		Geschubde inktzwam	Coprin chevelu		
<i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc.	Ophiocordycipitaceae	<i>Paecilomyces hepiali</i> Q.T. Chen & R.Q. Dai <i>Ophiocordyceps sinensis</i>			Enkel het gebruik in voedingssupplementen is toegelaten.	Seule l'utilisation dans les compléments alimentaires est autorisée.
<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.: Fr.) Singer	Physalacriaceae		Fluweelpootje	Collybie à pied velouté		
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.	Ganodermataceae		Gesteelde lakzwam	Ganoderma, Bois de Cerf, Ganoderme luisant		
<i>Ganoderma tsugae</i> Murr.	Ganodermataceae					

<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray	Meripilaceae		Eikhaas	Poule de bois, Polypore en touffes		
<i>Grifola umbellata</i> (Pers.) Pilat	Meripilaceae		Schermpjeseikhaas			
<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.: Fr.) Kummer	Strophariaceae		Dennezwavelkop	Hypholome doux		
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.: Fr.) Pers.	Hericiaceae		Pruikzwam	Hydne hérisson		
<i>Hirneola auricula-judae</i> (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae		Judasoor	Oreille de Judas		
<i>Hypsizygus tessulatus</i> (Bull.: Fr.) Sing.	Lyophyllaceae		Buna Shimeji	Buna Shimeji		
<i>Hypsizygus ulmarius</i> (Bull.: Fr.) Kühner	Lyophyllaceae		Iepenzwam	Lyophylle de l'Orme		
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.: Fr.) Murrill	Fomitopsidaceae		Zwavelzwam	Polypore souffré		
<i>Lasiosphaeria gigantea</i> Batch Ex Pers.	Lasiosphaeriaceae					
<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler	Marasmiaceae		Shiitake	Shiitake		
<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke	Tricholomataceae		Paarse schijnridder	Pied bleu		
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vitt.) Wasser	Agaricaceae		Blanke Parasolzwam	Lépiote pudique		
<i>Lyophyllum shimeji</i> (Kawam.) Hongo	Lyophyllaceae		Hon-Shimeji	Hon-Shimeji		
<i>Morchella esculenta</i> (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae		Gewone morielje	Morille commune		
<i>Pholiota mutabilis</i> (Scop.: Fr.) Kumm. Smith & Singer	Strophariaceae		Kleine bundelzwam	Pholiote changeante		
<i>Pholiota nameko</i> (I. Ito) S. Ito & Imai	Strophariaceae		Nameko	Naméko		
<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae		Trechteroesterzwam	Pleurote corne, Rolland d'abondance		
<i>Pleurotus citrinopileatus</i> Singer	Pleurotaceae		Goudkleurige oesterzwam	Pleurote jaune		
<i>Pleurotus colombinus</i>	Pleurotaceae					
<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae		Trechteroesterzwam	Pleurote corne, Rolland d'abondance		
<i>Pleurotus cystidiosus</i> O.K. Miller	Pleurotaceae					
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae		Kruisdisteloesterzwam	Pleurote du Pancaut		
<i>Pleurotus flabellatus</i> (M.J. Berk & Broome) Sacc.	Pleurotaceae					
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. : Fr.) P. Kumm	Pleurotaceae		Gewone oesterzwam	Pleurote en huître		
<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae		Bleke oesterzwam	Pleurote pulmonaire		
<i>Pleurotus sajor-caju</i> (Fries) Singer	Pleurotaceae					
<i>Pleurotus salmoneostramineus</i> Vassil	Pleurotaceae		Zalmoesterzwam	Pleurote saumon		

Pleurotus sp. Florida (Eger)	Pleurotaceae		Floridazwam	Pleurote de Floride		
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.	Polyporaceae		Schermpjeseikhaas	Polypore en ombelle		
Stropharia rugosoannulata Murrill	Strophariaceae		Blauwplaatstropharia	Strophaire à anneau rugueux		
Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Singer	Pluteaceae		Rijststrozwam, Tropische beurszwam	Volvaire cultivée		

Les champignons repris dans la partie 2 de la liste 2 dans la mesure où ils peuvent être cultivés et restent propres à la consommation humaine.

Partie 2: Champignons sauvages qui peuvent être mis dans le commerce pour autant que la réglementation pour la conservation des espèces menacées le permette

Nom scientifique	Famille	Synoniem	Nom néerlandais	Nom français	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
Wetenschappelijke naam	Familie	Synonyme	Nederlandse naam	Franse naam		
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.	Agaricaceae		Straatchampignon	Psalliote des trottoirs		
Agaricus campestris L.: Fr.	Agaricaceae		Weidechampignon	Agaric champêtre		
Agrocybe cylindracea (DC.: Fr.) Maire	Bolbitiaceae		Populierleemhoed	Pholiote du jeuplier; Pivoulade		
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck.	Pyronemataceae		Grote oranje bekerzwam	Pézize orangée		
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F. Gray	Amanitaceae		Parelamaniet	Amanite rougissante; Golmotte		
Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kummer s.l.	Physalaciaceae		Honingzwam s.l.	Armillaire couleur de miel s.l.		
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae		Judasoor	Oreille de Judas		
Boletus badius non sensu Persoon	Boletaceae	Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert	Kastanjeboleet	Bolet bai		
Boletus edulis Bull.: Fr.	Boletaceae		Eekhoortjesbrood	Cèpe de Bordeaux		
Boletus erythropus Pers.	Boletaceae		Gewone heksenboleet	Bolet à pied rouge		
Bovista plumbea Pers.	Agaricaceae		Loodgrîze bovist	Boviste plombée	Enkel het gebruik van het vruchtblichaam is toegelaten.	Seule l'utilisation du sporophore est autorisée.
Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer	Lyophyllaceae		Voorjaarspronkriddler	Tricholome de la Saint-Georges; Mousseron		
Cantharellus cibarius Fr.: Fr.	Cantharellaceae		Hanekam; Dooierzwam; Cantharel	Chanterelle orangée		
Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr.	Cantharellaceae		Trechtercantharel	Chanterelle en tube		
Coprinus comatus (Müll.: Fr.) S.F. Gray	Agaricaceae		Geschubde inktzwam	Coprin chevelu		

<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.: Fr.) Pers.	Cantharellaceae		Hoorn-van-overvloed	Trompette de la mort		
<i>Disciotis venosa</i> (Pers.: Fr.)	Morchellaceae		Groteaderbekerzwam	Pézize veinée		
<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.: Fr.) Singer	Physalacriaceae		Fluweelpootje	Collybie à pied velouté		
<i>Hydnum repandum</i> L.: Fr.	Hydnaceae		Gele stekelzwam	Pied de mouton		
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wlf.: Fr.) Maire	Hygrophoropsidaceae		Valse cantharel	Fausse girolle		
<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.) Cooke	Hydnangiaceae		Amethystzwam; Rode koolzwam	Laッcaire améthyste		
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.) Cooke	Hydnangiaceae		Fopzwam	Laッcaire laqué		
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.: Fr.) Gray	Russulaceae		Oranjegroene melkzwam	Lactaire délicieux		
<i>Langermannia gigantea</i> (Batsch.: Pers.) Rostk.	Agaricaceae		Reuzenbovist	Vesse-de-loup géante		
<i>Lepista inversa</i> (Scop.) Pat.	Tricholomataceae		Roodbruine trechterzwam	Clitocybe inversé		
<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke	Tricholomataceae		Paarse schijnridderzwam	Pied bleu		
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vitt.) Wasser	Agaricaceae	Lepiota naucina	Blanke parasolzwam	Lépiote pudique		
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Singer	Agaricaceae		Grote parasolzwam	Coulemelle, Lépiote élevée		
<i>Marasmius oreades</i> (Balt.: Fr.) Fr.	Marasmiaceae		Weidekringzwam	Marasme des Oréades; Faux mousseron		
<i>Morchella angusticeps</i> Peck	Morchellaceae			Morille		
<i>Morchella elata</i> Fr.: Fr.	Morchellaceae		Kegelmorielje	Morille conique		
<i>Morchella esculenta</i> (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae		Gewone morielje	Morille commune		
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) Kummer	Pleurotaceae		Gewone Oesterzwam	Pleurote en forme d'huître		
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Russulaceae		Regenboogrussula	Russule charbonnière		
<i>Russula vesca</i> Fr.	Russulaceae		Smakelijke russula	Russule comestible		
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	Russulaceae		Ruze russula	Russule verdooyante; Palomet		
<i>Suillus granulatus</i> (L.) O. Kuntze	Suillaceae		Melkboleet	Bolet granulé		
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch: Fr.) Singer	Suillaceae		Gele ringboleet	Bolet élégant		
<i>Suillus luteus</i> (L.: Fr.) S.F. Gray	Suillaceae		Bruine ringboleet	Bolet jaune		
<i>Tremella fuciformis</i> Berk.	Tremellaceae		Witte trilzwam	Trémelle blanche		
<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken	Tricholomataceae		Matsu-take	Matsutake		
<i>Tricholoma populinum</i>	Tricholomataceae		Lange Populierridderzwam	Tricholome des peupliers		
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.: Fr.) Quélet	Tricholomataceae		Glanzende ridderzwam	Tricholome prétentieux		
<i>Tricholoma terreum</i> (Sch.: Fr.) Kummer	Tricholomataceae		Donkergrize ridderzwam	Tricholome terneux; Petit-gris		
<i>Tuber aestivum</i> Vitt.	Tuberaceae		Zomertruffel	Truffe d'été		
<i>Tuber magnatum</i> Pico sp.	Tuberaceae		Witte truffel	Truffe blanche		

<i>Tuber melanosporum</i> Vitt.	Tuberaceae		Perigordtruffel	Truffe du Périgord		
<i>Tuber indicum</i> Cooke & Massee	Tuberaceae		Chinese of Aziatische truffel	Truffe chinoise ou asiatique		
<i>Tuber uncinatum</i> Chatin	Tuberaceae		Bourgognetruffel	Truffe de Bourgogne		
<i>Wolfiporia extensa</i> (Peck) Ginns	Fomitopsidaceae	<i>Poria cocos</i> Wolf		Pachyme	Enkel het gebruik van het sclerotium is toegelaten.	Seule l'utilisation du sclérote est autorisée.

Liste 3: Plantes à notifier si sous forme prédosée

Botanische naam / Nom botanique	Familie / Famille	Synoniem / Synonyme	Naam	Nom	Toegelaten plantendeel of specifieke bereiding	Parties de plante autorisée ou préparation particulière	Voorwaarden	Conditions
<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	Malvaceae		oker, okra	okra, gombo, cabo, calou	vrucht	fruit		
<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	Malvaceae		ambrettezaad, muskuszaad	ambrette	zaad	graine		
<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae		gewone zilverspar, grote spar, zilverspar	sapin pectiné, sapin blanc, sapin argenté	schors, tak, naald, knop, zaad, hars	écorce, rameau, aiguille, bourgeon, graine, résine		
<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.	Pinaceae		balsemspar, canadabalsem	sapin baumier	schors, naald, hars, twijg	écorce, aiguille, résine, brindille		
<i>Abies nordmanniana</i> subsp. <i>equi-trojani</i> (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen	Pinaceae	<i>Abies pectinata</i> Dc. Var. <i>Equi-Trojani</i> Asch. & Sint. Ex Boiss	nordmann-spar, kaukasische spar, krimspar	sapin de nordmann, sapin du caucase, sapin de crimée	schors, naald	écorce, aiguille		
<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	Pinaceae		siberische zilverden	sapin de sibérie	schors, tak, naald, hars	écorce, rameau, aiguille, résine		
<i>Abroma augusta</i> L. f	Malvaceae				wortelschors	écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

							Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	Leguminosae			acacia à cachou, cachoutier	gom	gomme		
<i>Acacia decurrens</i> Willd.	Leguminosae				gom	gomme		
<i>Acacia nilotica</i> (L.) Delile	Leguminosae	<i>Acacia arabica</i> (Lam.) Willd.	echte acacia, gom-acacia	acacia du nil	schors, vrucht, gom	écorce, fruit, gomme		
<i>Acacia senegal</i> (L.) Willd.	Leguminosae		arabische gom	gommier blanc, acacia sénégal	schors, gom	écorce, gomme		
<i>Acacia seyal</i> Delile	Leguminosae				gom	gomme		
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae		stekelige berenklauw	acanthe molle, acanthe à feuilles larges	hele plant	plante entière		
<i>Acer campestre</i> L.	Sapindaceae		Spaanse aak, veldesdoorn	Érable champêtre	knop	bourgeon	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
<i>Acer negundo</i> L.	Sapindaceae		vederesdoorn	érable negundo, érable négondo, érable à giguère, érable à feuilles de frêne, érable américain	schors	écorce	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
<i>Acer saccharinum</i> L.	Sapindaceae		witte esdoorn of zilveresdoorn	érable argenté, érable de virginie, plaine blanche	bast, hout	liber, bois	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
<i>Achillea ageratum</i> L.	Compositae			achillée à feuilles d'agératum, achillée visqueuse	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Achillea atrata</i> L.	Compositae		dofzwart duizendblad	achillée noirâtre	bovengrondse delen	parties aériennes		

Achillea erba-rotta All.	Compositae			achillée à feuilles simples	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) I.Richardson	Compositae		duizendblad, hemdsknoopjes, muskusduizendblad	achillée musquée	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo	Compositae	Diotis candidissima Desf., Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns & Link			bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea millefolium L.	Compositae		gewoon duizendblad	achillée millefeuille	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea nana L.	Compositae		wilde bertram	achillée naine	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea ptarmica L.	Compositae		wilde bertram	achillée sternutatoire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achyranthes bidentata Blume	Amaranthaceae		dubbelgetande amarant	achyranthes bidentata blume	wortel	racine		
Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen	Compositae		parakres, kiespijnknoppenkru id, braziliaanse cresson	cresson de para, brède mafane	bovengrondse delen	parties aériennes		
Acorus calamus L.	Acoraceae		kalmoes, echte kalmoes	acore, acore odorant, acore vrai	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van beta-asarone hoger dan 115 µg en 2 µg/kg lichaamsgewicht. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de bêta-asarone supérieure à 115 µg et 2 µg/kg poids corporel. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Actaea heracleifolia (Kom.) J.Compton	Ranunculaceae	Cimicifuga heracleifolia Kom.	zilverkaars		wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion

							de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoeningen.	supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.
Actaea racemosa L.	Ranunculaceae	Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.	zwarte amerikaanse slangewortel	actée américaine, cimicaire	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoeningen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.
Actinidia chinensis Planch.	Actinidiaceae		kiwi, chinese kruisbes	kiwi, groseille de chine	vrucht, knop	fruit, bourgeon		
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson	Actinidiaceae		kiwi	kiwi	vrucht, knop	fruit, bourgeon		

<i>Adansonia digitata L.</i>	Malvaceae		baobab	baobab, pain de singe	vrucht	fruit		
<i>Adiantum capillus-veneris L.</i>	Pteridaceae		europees venushaar	capillaire, cheveux de vénus	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Adiantum pedatum L.</i>	Adiantaceae		hoefijzervaren	adiante du canada, capillaire du canada, adiente pédalée	hele plant gekookt of gedroogd	plante entière cuite ou sechée	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Adoxa moschatellina L.</i>	Adoxaceae		muskuskruid	petite musquée	hele plant	plante entière		
<i>Aegopodium podagraria L.</i>	Apiaceae		zevenblad	égopode podagraire, herbe aux goutteux, podagraire	blad	feuille		
<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	Hippocastanaceae		witte paardekastanje	marronnier commun, marronnier d'inde	zaad, bladknop	graine, bourgeon de feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van aescine hoger dan 75 mg. De analyseresultaten moeten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'aescine supérieure à 75 mg. Les résultats d'analyse doivent

							beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Aframomum angustifolium</i> (Sonn.) K.Schum.	Zingiberaceae	<i>Amomum angustifolium</i> Sonn.	madagascar cardamom	maniguette fine, cardamom de Madagascar	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Aframomum exscapum</i> (Sims) Hepper	Zingiberaceae				vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Agathosma betulina</i> (P.J.Bergius) Pillans	Rutaceae	<i>Barosma betulina</i> (P.J.Bergius) Bartl. et H.L. Wendl.	bucco, boechoe	buchu	blad	feuille		
<i>Agathosma crenulata</i> (L.) Pillans	Rutaceae	<i>Barosma crenulata</i> (L.) Hook., <i>Barosma serratifolia</i> (Curtis) Willd.	eironde buchu		blad	feuille		
<i>Agathosma serratifolia</i> (Curtis) Spreeth	Rutaceae				blad	feuille		
<i>Agave americana</i> L.	Asparagaceae		honderdjarige aloë	agave américain, agave d'amérique	bloemstengel	tige florale		
<i>Agave sisalana</i> Perrine	Asparagaceae		sisal	sisal	bloemstengel, wortel	tige florale, racine		
<i>Agave tequilana</i> F.A.C. Weber	Asparagaceae		blauwe agave	agave bleu	bloemstengel, blad	tige florale, feuille		
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Rosaceae		gewone agrimonie	aigremoine eupatoire	hele plant	plante entière		
<i>Agrimonia repens</i> L.	Rosaceae	<i>Agrimonia odorata</i> Mill.	welriekende agrimonie	aigremoine odorante	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Lamiaceae		akkerzenegroen	bugle petit pin, d'ive ou d'ivette	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb.	Lamiaceae			ivette musquée, germandrée musquée, bugle fausse ivette	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Ajuga reptans</i> L.	Lamiaceae		kruipend zenegroen	bugle rampante	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae		perzische slaapboom, zijdeboom	acacia de constantinople, arbre de soie	schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas

							gebruiken tijdens de zwangerschap.	utiliser en cas de grossesse.
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	<i>Althaea rosea</i> (L.) Cav	stokroos	passe-rose, passerose, rose trémière	bloem	fleur		
<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Rosaceae	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	spitslobbige vrouwemantel	alchémille à lobes aigus	hele plant	plante entière		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Alismataceae		grote waterweegbree	plantain d'eau commun	wortel	racine		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> subsp. <i>orientale</i> (Sam.) Sam.	Alismataceae	<i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juz.	waterweegbree	plantain d'eau	wortelstok, knol	rhizome, tubercule		
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	<i>Sisymbrium alliaria</i> (L.) Scop.	look-zonder-look	alliaire, herbe à ail	hele plant	plante entière		
<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Amaryllidaceae	<i>Allium porrum</i> L.	oerprei	Poireau d'été	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Allium ascalonicum</i> L.	Amaryllidaceae		sjalot	échalote, échalotte	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Allium cepa</i> L.	Amaryllidaceae		ui	oignon	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

								concomitant d'anticoagulants.
Allium sativum L.	Amaryllidaceae		knoflook	ail cultivé	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Allium schoenoprasum L.	Amaryllidaceae		bieslook	ciboulette	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Allium ursinum L.	Amaryllidaceae		daslook	ail des ours	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Betulaceae		zwarte els	aulne noir, aulne glutineux, aulne commun	schors, bladknop, blad, gom	écorce, bourgeon de feuille, feuille, gomme		
Alnus incana (L.) Moench	Betulaceae		grauwe els, witte els, grijsige els	aulne blanc, aulne rugueux, aulne de montagne, arcoce, varne	schors, bladknop	écorce, bourgeon de feuille		
Aloe africana Mill.	Xanthorrhoeacea e				blad, gel, latex (sap)	feuille, gel, latex (jus)	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire

							inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloïne) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe arborescens Mill.	Xanthorrhoeacea e		kandelaaraloë	aloës arborescent	blad, gel	feuille, gel	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloïne) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

							zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe ferox Mill.	Xanthorrhoeacea e		kaapse aloë	aloës	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloïne) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe perryi Baker	Xanthorrhoeacea e				blad, gel	feuille, gel	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloïne) hoger dan 14 mg. De	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloïne) supérieure à 14

							analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe plicatilis (L.) Mill.	Xanthorrhoeacea e	waaieraalwijn, waaieraloë	aloès éventail	blad, gel	feuille, gel	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloïne) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation	

							gebruik zonder deskundig advies.	prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe vera (L.) Burm. f.	Xanthorrhoeaceae	Aloe barbadensis Mill.	echte aloë	aloës	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloïne) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloysia citriodora Palau	Verbenaceae	Lippia citriodora (Lam.) Kunth, Aloysia triphylla (L'Hér) Britton	geurig ijzerhard, citronelle	verveine odorante, verveine citronnée, citronelle verveine	blad	feuille		
Alpinia galanga (L.) Willd.	Zingiberaceae		grote galgant	grand galanga	wortelstok	rhizome		
Alpinia hainanensis K.Schum.	Zingiberaceae	Alpinia katsumadae Hayata			hele plant	plante entière		

<i>Alpinia officinarum</i> Hance	Zingiberaceae		kleine galgant	petit galanga	wortelstok	rhizome		
<i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.	Zingiberaceae				vrucht, wortelstok	fruit, rhizome		
<i>Althaea officinalis</i> L.	Malvaceae		echte heemst, witte malve, witte maluw	guimauve officinale, mauve blanche, bourbon de saint-jacques	hele plant	plante entière		
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	Amaranthaceae		kattenstaartamarant	amarante queue de renard, amarante caudée	blad, zaad	feuille, graine		
<i>Amaranthus cruentus</i> L.	Amaranthaceae		paarse amarant	amarante étalée, amarante couleur de sang, amarante rouge, amarante paniculée, amarante sanglante, épинard du soudan, queue de renard	zaad	graine		
<i>Ammi visnaga</i> Lam.	Apiaceae		fijn akkerscherm, khella	petit ammi, herbe aux cure-dents, khella	vrucht	fruit		
<i>Amomum villosum</i> var. <i>xanthioides</i> (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.J.Chen	Zingiberaceae	<i>Amomum xanthioides</i> Wall. ex Baker			zaad	graine		
<i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch	Araceae		konjac	konjac	wortel	racine		
<i>Amyris balsamifera</i> L.	Rutaceae		amyris, sandelhout west, west-indisch rozenhout	amyris baumier, amyris, bois de rose, chandelle	hout, oliehars	bois, oléorésine		
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae		ananas	ananas	vrucht	fruit		
<i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees	Acanthaceae		justicie, indiase gentiaan	echinacée d'inde	blad	feuille		
<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge	Asparagaceae				wortelstok	rhizome		
<i>Anethum graveolens</i> L.	Apiaceae		dille	aneth, fenouil bâtarde	vrucht	fruit		
<i>Angelica archangelica</i> L.	Apiaceae		grote engelwortel	angélique vraie	hele plant	plante entière		

<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	Apiaceae		aziatische engelwortel, bai zhi	bai zhi	wortel	racine		
<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	Apiaceae		shishiudo, du huo	shishiudo, du huo	hele plant	plante entière		
<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Apiaceae		chinese engelwortel, dong quai	angélique chinoise, dong quai	hele plant	plante entière		
<i>Angelica sylvestris</i> L	Apiaceae		gewone engelwortel	angélique des bois	blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
<i>Angostura trifoliata</i> (Willd.) T.S.Elias	Rutaceae	Cusparia officinalis Engl.; Cusparia trifoliata (Willd.) Engl.			schors	écorce		
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae		zuurzak, guanábana	corosolier	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité déetectable en acétogénines.
<i>Annona reticulata</i> L.	Annonaceae		custardappel, ossenhart	cachiman, corosolier réticulé, anone cœur de bœuf, cœur de bœuf	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité déetectable en acétogénines.
<i>Annona squamosa</i> L.	Annonaceae		zoetzak, suikerappel, kaneelappel of schubappel	attier, pommier cannelle	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité déetectable en acétogénines.
<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd.	Combretaceae				bast, gom	liber, gomme		

Anredera baselloides (Kunth) Baill.	Basellaceae				blad, wortel	feuille, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Compositae		rozenkransje	pied-de-chat, pied-de-chat dioïque	bovengrondse delen	parties aériennes		
Anthemis tinctoria L.	Compositae		gele kamille	anthémis des teinturiers, camomille des teinturiers	hele plant	plante entière		
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Apiaceae		echte kervel	autres noms communs : camomille puante, anthémis puante, camomille des chiens, maroute, camomille maroute, marouette, anthémis cotule, anthémis bâtarde, œil-de-vache.	bloeiende toppen	sommités fleuris		
Anthyllis vulneraria L.	Leguminosae		wondklaver	vulnéraire	hele plant	plante entière		
Antirrhinum majus L.	Plantaginaceae		grote leeuwenbek	grand mufler, mufler à grandes fleurs, gueule-de-loup, gueule-de-lion	bovengrondse delen	parties aériennes		
Aphanes arvensis L.	Rosaceae	Alchemilla arvensis (L.) Scop.	grote leeuwenklauw	alchemille des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
Aphanizomenon flosaqua Ralfs ex Bornet & Flahault	Nostocaceae		klamath, AFA	algue blue-vert du lac clamath, AFA	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden marine toxines	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité déetectable en

							bevat. Het gehalte aan microcystine moet onder 1 µg/g zijn.	toxines marines. La teneur en microcystine doit être inférieure à 1 µg/g.
<i>Apium graveolens L.</i>	Apiaceae		selderij	céleri sauvage	hele plant	plante entière		
<i>Arachis hypogaea L.</i>	Leguminosae		aardnoot	arachide, cacahuète	zaad, vette olie	graine, huile grasse		
<i>Aralia elata (Miq.) Seem.</i>	Araliaceae		japanse engelenboom	angélique en arbre du japon	blad, wortelschors	feuille, écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Aralia racemosa L.</i>	Araliaceae		trosaralia, amerikaanse nardus	aralia à grappes	wortelstok, wortel	rhizome, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Arbutus unedo L.</i>	Ericaceae		aardbeiboom	arbousier commun	vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Arctium lappa L.</i>	Compositae		amerikaanse nardus	grande bardane	hele plant	plante entière		
<i>Arctium minus (Hill) Bernh.</i>	Compositae	<i>Lappa minor</i> Hill	kleine klit	petite bardane	hele plant	plante entière		
<i>Arctium tomentosum Mill.</i>	Compositae		donzige klit	bardane tomenteuse, bardane poilue	hele plant	plante entière		
<i>Argania spinosa (L.) Skeels</i>	Sapotaceae		arganboom	arganier	vrucht, pitolie	fruit, huile de noyaux	Voor de pitolie, enkel de producten conform met de toelating als novel food	Pour l'huile de noyaux, seuls les produits conformes à l'autorisation en

							voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Brassicaceae		mierikswortel, mierik	raifort, cranson	wortel	racine		
Artemisia abrotanum L.	Compositae	Artemisia procera Willd.	citroenkruid	aurone, citronnelle, aurone mâle, abrotone, armoise citronnelle, arquebuse.	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia absinthium L.	Compositae		absintalsem		bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia capillaris Thunb.	Compositae		welriekende alsem	armoise capillaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia dracunculus L.	Compositae		dragon	estragon	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia frigida Willd.	Compositae		westerse bijvoet	armoise douce	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de

								thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia genipi</i> Weber ex Stechm.	Compositae		alpenbijvoet	génépi vrai, génépi noir	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia glacialis</i> L.	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia judaica</i> L.	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia pontica</i> L.	Compositae		kleine alsem, pontische alsem	petite absinthe, absinthe romaine	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	Compositae		kleine alpenabsint	génépi blanc	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia vallesiaca</i> All.	Compositae			armoise du valais	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Compositae		bijvoet	armoise vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg	Moraceae		broodboom	arbre à pain	vrucht, zaad, hout	fruit, graine, bois	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
<i>Ascophyllum nodosum</i> (L.) Le Jolis	Fucaceae		knotswier	ascophylle noueuse	thallus	thallus		
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	Annonaceae		pawpaw	asiminier	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénines.
<i>Aspalathus linearis</i> (Burm. f.) R. Dahlgren	Leguminosae		aspalathus, rooibos thé	aspalathus, rooibos thé	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	Asparagaceae		chinese asperge	asperge chinoise	wortel	racine		
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparagaceae		asperge	asperge	wortel, scheut	racine, pousses		
<i>Asparagus racemosus</i> Willd.	Asparagaceae		satavari, satavar, shatamull		wortelstok	rhizome		
<i>Astracantha adscendens</i> (Boiss.)	Leguminosae	<i>Astragalus adscendens</i>			gom	gomme		

& Hausskn.) Podlech		Boiss. & Hausskn.						
<i>Astracantha cretica</i> (Lam.) Podlech	Leguminosae	<i>Astragalus creticus</i> Lam.			gom	gomme		
<i>Astracantha gummifera</i> (Labill.) Podlech	Leguminosae	<i>Astragalus gummifer</i> Labill.			gom	gomme		
<i>Astracantha microcephala</i> (Willd.) Podlech	Leguminosae	<i>Astragalus microcephalus</i> Willd.			gom	gomme		
<i>Astragalus membranaceus</i> Moench	Leguminosae		astragalus	astragale	wortel	racine		
<i>Astrantia major</i> L.	Apiaceae		zeeuws knoopje, groot sterrenscherf	grande astrance, grande radiaire	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Athamanta macedonica</i> (L.) Spreng.	Apiaceae				vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Compositae				wortelstok, wortel	rhizome, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.	Compositae				wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	Compositae				wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing	L'étiquetage doit comporter l'avertissement

							bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.  suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Avena fatua L.	Poaceae		oot	folle-avoine, averon, coquiole, havenon	bovengrondse delen	parties aériennes	
Avena sativa L.	Poaceae		haver, gekweekte haver	avoine, avoine cultivée	bovengrondse delen	parties aériennes	
Baccharis trimera (Less.) DC.	Compositae	Baccharis genistelloides var. trimera (Less.) Baker	carqueja	baccharis	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.  L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Bacopa monnieri (L.) Wettst.	Plantaginaceae	Bacopa monnieri (L.) Pennell	kleinbladige bacopa, brahmi	hysope d'eau, brahmi	hele plant	plante entière	
Bactris gasipaes Kunth	Arecaceae		perzikpalm	palmier pêche, péjibae, parépou	vrucht	fruit	
Balanites aegyptiaca (L.) Delile	Zygophyllaceae			dattier du désert	hele plant	plante entière	
Ballota nigra L.	Lamiaceae		stinkende ballote	ballotte fétide, ballotte noire	bovengrondse delen	parties aériennes	
Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek	Lamiaceae		stinkende ballote	ballotte du midi, ballotte fétide	hele plant	plante entière	
Bambusa bambos (L.) Voss	Poaceae	Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.	bamboe	bambou tabashir	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.  La matière première doit être traitée à la chaleur.
Bambusa vulgaris Schrad.	Poaceae		bamboe	bambou	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.  La matière première doit être traitée à la chaleur.

<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	Brassicaceae		vroeg barbarakruid	cresson de terre, barbarée printanière	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Brassicaceae		gewoon barbarakruid	barbarée commune, herbe de sainte-barbe	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Bellis perennis</i> L.	Compositae		madeliefje	pâquerette	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Berberis aquifolium</i> Pursh.	Berberidaceae	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	<i>mahonia aquifolium</i> (pursh) nutt.	mahonia	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
<i>Berberis aristata</i> DC.	Berberidaceae				wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberidaceae		zuurbes	epine-vinette	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae		paranoot, brazielnoten, Amazonianoten	noyer d'Amazonie, noyer du Brésil, châtaignier du Brésil	noot	noix		

Beta vulgaris L.	Amaranthaceae		gekweekte biet	betterave cultivée	hele plant	plante entière		
Betula alleghaniensis Britton	Betulaceae		gele berk	bouleau jaune	schors, blad	écorce, feuille		
Betula lenta L.	Betulaceae		suikerberk	bouleau flexible, bouleau acajou, bouleau merisier	schors, blad, sap	écorce, feuille, sève		
Betula pendula Roth	Betulaceae		ruwe berk	bouleau verruqueux, bouleau blanc	knop, schors, blad, teer, sap	bourgeon, écorce, feuille, goudron, sève		
Betula pubescens Ehrh.	Betulaceae		zachte berk, gewone berk	bouleau pubescent, bouleau des marais	knop, schors, blad, sap	bourgeon, écorce, feuille, sève		
Bixa orellana L.	Bixaceae		orleaanboom	rocoyer	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine		
Blainvillea acmella (L.) Philipson	Compositae	Spilanthes acmella (L.) Murray, Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen	champagneblad, abc-kruid, parakers	brèdes mafane	bovengrondse delen	parties aériennes		
Borago officinalis L.	Boraginaceae		bernagie, komkommerkruid	bourrache, bourrache officinale	bloem, zaad	fleur, graine	Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.
Boronia megastigma Nees ex Bartlett	Rutaceae		boronia	boronia	bovengrondse delen	parties aériennes		
Boswellia sacra Flueck.	Burseraceae		wierookboom	arbre à encens	gomhars	gomme-résine		
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.	Burseraceae		wierookboom	encens	oliehars	oléorésine		
Brassica cretica Lam.	Brassicaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Brassica napus L.	Brassicaceae	Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.	koolzaad	colza, navette	wortel, zaad	racine, graine		

<i>Brassica nigra</i> (L.) K.Koch	Brassicaceae		zwarte mosterd	moutarde noire	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Brassica oleracea</i> L.	Brassicaceae		incl. tuinkool	incl. chou potager	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitriine en 5 mg goitriine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitriine supérieure à 20 mg et de goitriine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Brassica rapa</i> L.	Brassicaceae	<i>Sinapis juncea</i> L.	raapzaad	navette d'été	hele plant	plante entière		
<i>Buglossoides arvensis</i>	Boraginaceae				olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
<i>Bupleurum chinense</i> DC.	Apiaceae		sikkelgoudscherm	buplèvre chinois	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas

							van anticoagulantia of antidiabetische behandeling.	d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement contre le antidiabète
<i>Bupleurum rotundifolium L.</i>	Apiaceae		doorwas	buplèvre à feuilles rondes	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement contre le diabète.
<i>Bursera tomentosa (Jacq.) Triana &amp; Planch.</i>	Burseraceae				vrucht, schors	fruit, écorce	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden podophyllotoxine en analogen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en podophyllotoxine et analogues.
<i>Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.</i>	Leguminosae		grijze knikkernoot	canique grise, z'yeux à chatte	schors, zaad	écorce, graine		
<i>Cakile maritima Scop.</i>	Brassicaceae		zeeraket	roquette de mer, cakilier maritime, tétine de souris	blad, wortel	feuille, racine		
<i>Calendula arvensis (Vaill.) L.</i>	Compositae		akkergoudsbloem	souci des champs, souci sauvage	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap. Niet gebruiken bij leverproblemen.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas des problèmes de foie.
<i>Calendula officinalis L.</i>	Compositae		tuingoudsbloem	souci officinal	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas

							Niet gebruiken bij leverproblemen.	utiliser en cas des problèmes de foie.
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Ericaceae		struikhei	callume, bruyère commune	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Brassicaceae		huttentut, dederzaad, vlasdodder, vlasdotter	cameline, lin bâtarde	zaad	graine		
<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Theaceae		theestruik	théier	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname hoger dan 600 mg looistoffen (uitgedrukt als epigallocatechine-3-gallaat). Enkel het gebruik van volgende extractievloeistoffen zijn toegelaten: water, alcohol met een maximumgehalte van 25 %.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de tanins (exprimé en épigallocatéchine-3-gallate) supérieure à 600 mg. Seule l'utilisation des solvants d'extraction suivants est acceptée: eau, alcool avec une teneur maximale de 25%.
<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. & Thomson	Annonaceae		ylang-ylang	ylang-ylang, canang odorant	bloem	fleur	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 3 mg safrol.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de safrole supérieure à 3 mg.
<i>Canarium acutifolium</i> (DC.) Merr.	Burseraceae				noot	noix		
<i>Capparis spinosa</i> L.	Capparaceae		kappertjes	câprier commun, câprier épineux	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Brassicaceae		gewoon herderstasje	bourse-à-pasteur commune	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Capsicum annuum</i> L.	Solanaceae	<i>Capsicum frutescens</i> L.	spaanse peper, chilipepers, paprika, groene peper, rode peper	piment annuel, piment des jardins, piment rouge, poivre de guinée	vrucht	fruit		

<i>Carex arenaria</i> L.	Cyperaceae		zandzegge	laîche des sables	blad, wortelstok	feuille, rhizome		
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae		papaja, meloenboom	papayer	vrucht	fruit		
<i>Carissa carandas</i> L.	Apocynaceae		kristusdoorn	karonda	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Carlina acaulis</i> L.	Compositae		zilverdistel	carline acaule	wortel	racine		
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G.Martens	Compositae		hoge zilverdistel	carline argentée	wortel	racine		
<i>Carpinus betulus</i> L.	Betulaceae		haagbeuk	charme	knop, blad	bourgeon, feuille		
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Compositae			carthame laineux	olie van het zaad, bloem	huile de la graine, fleur		
<i>Carthamus</i> <i>tinctorius</i> L.	Compositae		saffloer	carthame des teinturiers	bloem, zaad	fleur, graine		
<i>Carum carvi</i> L.	Apiaceae		echte karwij	carvi, cumin de prés	vrucht	fruit		
<i>Cassia fistula</i> L.	Leguminosae		indische goudenregen	canéfier, cassier	vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen; - Geen langdurig	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation

							gebruik zonder deskundig advies.	prolongée sans avis d'un spécialiste.
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fagaceae		tamme kastanje	châtaigner, châtaignier commun	schors, bladknop, blad, zaad	écorce, bourgeon de feuille, feuille, graine		
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Bignoniaceae		groene trompetboom	catalpa bignioïdes, arbre aux haricots, catalpa boule, catalpa commun	blad	feuille		
<i>Ceanothus americanus</i> L.	Rhamnaceae		amerikaanse sering	thé du new jersey	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden peptide alkaloïden bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes peptidiques.
<i>Cecropia peltata</i> L.	Urticaceae			bois trompette, coulequin	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Cedrus libani</i> A. Rich.	Pinaceae		libanonceder, libanese ceder	cèdre du liban	kegelvrucht, blad, hout	cône, feuille, bois		
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae		kapokboom	kapokier, bois coton, fromager	bast, blad, olie van het zaad	liber, feuille, huile de la graine		
<i>Centaurea behen</i> L.	Compositae				bloem	fleur		
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Compositae		kalktrip	centaurée chausstrape, centaurée étoilée, chardon étoilé	bloem	fleur		
<i>Centaurea centaurium</i> L.	Compositae		centaurie, groot duizendguldenkruid	grande centaurée	bloem	fleur		

<i>Centaurea cyanus</i> L.	Compositae		korenbloem	bleuet des champs, centaurée bleuet	bloem	fleur		
<i>Centaurea jacea</i> L.	Compositae		knoopkruid	centaurée jacée, tête de moineau, ambrette	bloem	fleur		
<i>Centaurea montana</i> L.	Compositae		bergcentaurie	centaurée des montagnes	bloem	fleur		
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Gentianaceae	Erythraea centaurium (L.) Pers.	echt duizendguldenkruid	erythrée petite centaurée	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Apiaceae	Hydrocotyle asiatica L.	gotu kola	hydrocotyle d'asie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC	Caprifoliaceae		rode spoorbloem, rode valeriaan	valériane rouge, centranthe rouge	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden valedotriaten bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en valépotriates.
<i>Cerasus mahaleb</i> (L.) Mill.	Rosaceae		weichselboom	bois de sainte-lucie, cerisier de sainte- lucie, faux merisier	zaad	graine		
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminoseae		johannesbroodboo m	caroubier	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminoseae		judasboom	arbre de judée, gainier	vrucht, gomme van het zaad	fruit, gomme de la graine		
<i>Cetraria islandica</i> (L.)	Parmeliaceae		ijslands mos	lichen d'islande	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
<i>Chaenomeles</i> <i>speciosa</i> Nakai	Rosaceae		chinese sierkwee	cognassier de chine	vrucht	fruit		
<i>Chamaemelum</i> <i>nobile</i> (L.) All.	Compositae	Anthemis nobilis L.	roomse kamille	camomille romaine	bovengrondse delen	parties aériennes		

Chamaecrista nomame (Sieber) H.Ohashi	Leguminosae	Cassia nomame (Sieber) Honda			vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille		
Chelone glabra L.	Plantaginaceae		schildpadbloem	tête de tortue	bovengrondse delen	parties aériennes		
Chenopodium quinoa Willd.	Amaranthaceae		quinoa	quinoa	gewassen zaden	graines lavées		
Chenopodium vulvaria L.	Amaranthaceae		stinkende ganzenvoet	vulvaire	hele plant	plante entièvre	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en ascaridole.
Chimaphila umbellata (L.) Nutt.	Ericaceae	Chimaphila cymosa J.Presl & C.Presl	pipsissewa	chimaphile à ombelles, pirole en ombelle	hele plant	plante entièvre		
Chiococca alba (L.) Hitchc.	Rubiaceae			bejuco de berac	wortel	racine		
Chionanthus virginicus L.	Oleaceae		sneeuwvlokkenboo m	arbres à neige	wortelschors	écorce de racine		
Chlorella vulgaris Beijerinck	Chlorellaceae	Chlorella pyrenoidosa H. Chick, Chlorella communis Artari	chlorella	chlorella	éencellige alg	algue unicellulaire		
Chondrus crispus Stackhouse	Gigartinaceae		iers moswier	varech, mousse d'Irlande	thallus	thallus		
Chrysanthellum americanum (L.) Vatke	Compositae			chrysanthellum	bloeiende toppen	sommités fleuries		
Chrysanthellum indicum subsp. afroamericanum B.L. Turner	Asteraceae		gele kamille	camomille d'or	bovengrondse delen	parties aériennes		
Chrysophyllum cainito L.	Sapotaceae		cainito, sterappel	caïmitier, caïnite	vrucht	fruit		
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty	Poaceae		vetiver	vétiver	wortel	racine		
Cichorium endivia L.	Compositae		andijvie	chicorée endive	blad	feuille		

<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae		wilde cichorei	chicorée sauvage	hele plant	plante entière		
<i>Cinchona calisaya</i> Wedd.	Rubiaceae	<i>Cinchona ledgeriana</i> (Howard) Bern.Moens ex Trimen	kinaboom, quinaboom	quinquina jaune, quinquina calisaya	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
<i>Cinchona lancifolia</i> Mutis	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
<i>Cinchona micrantha</i> Ruiz & Pav.	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
<i>Cinchona nitida</i> Ruiz & Pav.	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse	La portion journalière

							hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona officinalis L.	Rubiaceae		kinaboom, quinaboom	quinquina jaune, quinquina calisaya	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd.	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona pubescens Vahl	Rubiaceae		rode kinaboom, rode kinine	quinquina rouge	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure

							De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	Lauraceae		kamferboom	camphrier, laurier du japon	hele plant	plante entière		
<i>Cinnamomum cassia</i> (Nees & T.Nees) J.Presl	Lauraceae	<i>Cinnamomum aromaticum</i> Nees	chinese kaneel	cannelier de chine	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Cinnamomum verum</i> J.Presl.	Lauraceae	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume, <i>C. zeylanicum</i> Nees	chinese kaneel, kaneelboom	cannelle de chine, cannelier	schors, blad	écorce, feuille		
<i>Cistanche salsa</i> (C.A. Mey.) G. Beck	Orobanchaceae				stengel	tige		
<i>Cistus creticus</i> L.	Cistaceae	<i>Cistus ladaniferus</i> Stokes	rotsroos	ciste de crête	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
<i>Cistus × incanus</i> L.	Cistaceae		cistusroos	ciste à gomme	hele plant	plante entière		
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistaceae		rotsroos	ciste de montpellier	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae		watermeloen	pastèque	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae		limoen	lime, limettier	vrucht	fruit		
<i>Citrus aurantium</i> L.	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>amara</i> Engl., <i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>sinensis</i> L., <i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>aurantium</i> L.,	bittere oranje appelboom curaçao oranjeappel	orange amère, bigaradier orange de curaçao	bloem, vrucht, pericarp	fleur, fruit, péricarpe	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van para-	Pour les compléments alimentaires avec des préparations du fruit: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de

		Citrus aurantium var. dulcis					synephrine hoger dan 20 mg. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden meta-synephrine bevat. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Niet gebruiken door personen die behandeld worden voor hypertensie. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij tekenen van onrust of nervositeit, de inname van het product stoppen.	para-synéphrine supérieure à 20 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en métá-synéphrine. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : - Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement . Ne pas utiliser en cas de traitement anti-hypertenseur . Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans . Cesser l'utilisation du produit en cas d'agitation ou de nervosité.
Citrus x limon (L.) Osbeck	Rutaceae	Citrus limon (L.) Burm. f.	citroenboom, limoen	citron, citronnier	bovengrondse delen	parties aériennes		
Citrus maxima (Burm.) Merr.	Rutaceae	Citrus grandis (L.) Osbeck, Citrus decumana L.	pompelmoesboom	pamplemoussier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Citrus medica L.	Rutaceae		sucade-citroen, cedraat, citroenboom	cédratier	vrucht, zaad	fruit, graine		
Citrus myrtifolia Raf.	Rutaceae	Citrus aurantium var. myrtifolia Ker Gawl.	chinotto	chinois	vrucht, pericarp	fruit, péricarpe		
Citrus nobilis Lour.	Rutaceae				vrucht	fruit		
Citrus paradisi Macfad.	Rutaceae		grapefruit	grapefruit	bovengrondse delen	parties aériennes		

Citrus reticulata Blanco	Rutaceae		mandarijn, tanquerine, satsuma, clementine	mandarinier, clémentine	bovengrondse delen	parties aériennes		
Citrus sinensis (L.) Osbeck	Rutaceae		sinaasappel	oranger	bloem, blad, vrucht	fleur, feuille, fruit		
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Cladoniaceae		echt rendiermos	lichen des rennes, lichen des caribous	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Clematis armandii Franch.	Ranunculaceae		bosrank	clématite d'armand	gedroogde stengel	tige séchée	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Clematis chinensis Osbeck	Ranunculaceae		chinese clematis		gedroogde wortel	racine séchée	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.

Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Req.) Govaerts	Lamiaceae	Calamintha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball			blad	feuille		
Clinopodium vulgare L.	Lamiaceae	Calamintha vulgaris (L.) Druce	borstelkrans	clinopode, clinopode commun, sariette vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Clitoria ternatea L.	Leguminosae		kittelbloem	pois bleu	bloem	fleur	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique.
Cnicus benedictus L.	Compositae		gezegende distel	chardon-bénit	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cochlearia officinalis L.	Brassicaceae		echt lepelblad	cochléaire officinale, cranson	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cocos nucifera L.	Arecaceae		kokospalm	cocotier	zaad, vette olie	graine, huile grasse		
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.	Campanulaceae		codonopsis	codonopsis	wortel	racine		
Coffea arabica L.	Rubiaceae		koffie (boom)	caféier	zaad	graine		
Coffea canephora Pierre ex Froehner	Rubiaceae	Coffea robusta Lind. ex De Wild	robusta koffieplant	caféier robusta	zaad	graine		
Coix lacryma-jobi L.	Poaceae		jobstranen	larmes de job	zaad	graine		
Coix lacryma-jobi var. ma-yuen (Rom.Caill.) Stapf	Poaceae	Coix ma-yuen Rom. Caill.	jobstranen	larmes de job	zaad, olie van het zaad	graine, huile de la graine		
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott et Endl.	Malvaceae		kolaboom	noix de cola, colatier	zaad	graine		
Cola nitida (Vent.) Schott et Endl.	Malvaceae		kolaboom	noix de cola, colatier	zaad	graine		
Coleus forskohlii (Poir.) Briq.	Lamiaceae				bovengrondse delen, wortel	parties aériennes, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec des

							gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	médicaments pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Combretum micranthum G.Don	combretaceae		kinkeliba	kinkéliba	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Combretum sundaicum Miq.	Combretaceae				blad, bladsteel	feuille, pédoncule		
Commiphora africana (A.Rich.) Endl.	Burseraceae		afrikaanse mirre	myrrhe africaine	gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora habessinica (O.Berg) Engl.	Burseraceae				gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora mukul Engl.	Burseraceae		guggul	myrrhe des indes	olie-gomhars	Oleo-gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora myrrha (Nees) Engl.	Burseraceae	Commiphora molmol (Engl.) Engl. ex Tschirch	mirre	myrrhe	olie-gomhars	oleo gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas

							gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Commiphora schimperi</i> (O.Bergman) Engl.	Burseraceae				gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Compositae	<i>Erigeron canadensis</i> L.	canadese fijnstraal	vergerette du cananda, conyze du canada	hele plant	plante entière		
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Leguminosae				oliehars van de schors	oléorésine de l'écorce		
<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino	Ranunculaceae				wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.
<i>Coptis teeta</i> Wall.	Ranunculaceae				wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.
<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	Ranunculaceae			coptide trifoliée	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en

							coptisine) hoger dan 10 mg.	coptisine) supérieure à 10 mg.
<i>Corallina officinalis</i> L.	Corallinaceae				thallus	thallus		
<i>Cordia myxa</i> L.	Boraginaceae		sebestenboom		vrucht	fruit	Het gehalte aan toxiche pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae		koriander	coriandre	bovengrondse delen, olie van het zaad	parties aériennes, huile de graine	Voor de olie van het zaad, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Pour l'huile de graine, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
<i>Cornus florida</i> L.	Cornaceae		grootbloemige amerikaanse kornoelje	cornouiller à fleurs d'amérique, bois-de-chien	vrucht, schors	fruit, écorce		
<i>Cornus mas</i> L.	Cornaceae		gele kornoelje	cornouiller mâle	vrucht	fruit		
<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.	Cornaceae		japanse kornoelje	cornouiller officinal	vrucht	fruit		
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornaceae		rode kornoelje	cornouiller sanguin, sanguin	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille		
<i>Corrigiola telephifolia</i> Pourr.	Molluginaceae			corrigiole à feuilles de téléphium	wortel	racine		
<i>Corylus avellana</i> L.	Betulaceae		hazelaar	noisetier, coudrier	bladknop, blad, vrucht, zaad	bourgeon de feuille, feuille, fruit, graine		
<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	Myrtaceae	Eucalyptus citriodora Hook.	citroen eucalyptus	eucalyptus citronné	blad	feuille		
<i>Coscinium fenestratum</i> (Goetgh.) Colebr.	Menispermaceae				wortel, stengel	racine, tige	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag	La portion journalière recommandée ne

							niet leiden tot een inname van isoquinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Crambe maritima L.	Brassicaceae		zeekool	chou marin, crambé maritime	hele plant	plante entière		
Crataegus azarolus L.	Rosaceae		azaroldoorn	azarolier, azérolier	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crataegus curvisepala Lindm.	Rosaceae		koraalmeidoorn	aubépine à feuilles en éventail	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crataegus laevigata (Poir.) DC.	Rosaceae	Crataegus oxyacantha auct.	tweestijlige meidoorn	aubépine à deux styles	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, feuille, sommité fleurie, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.

<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae		eenstijlige meidoorn	aubépine à un style	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, feuille, sommité fleurie, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
<i>Crataegus pentagyna</i> Waldst. & Kit.	Rosaceae				vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
<i>Critchmum maritimum</i> L.	Apiaceae		zeevenkel	fenouil marin, perce-pierre	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Crocus sativus</i> L.	Iridaceae		saffraankrokus	safran	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van depressie behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la dépression.
<i>Crossostephium chinense</i> (A.Gray ex L.) Makino	Compositeae				bovengrondse delen	parties aériennes		

Cruciata laevis Opiz	Rubiaceae	Galium cruciata (L.) Scop.	kruisbladwalstro	gaillet croisette	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cryptocarya agathophylla van der Werff	Lauraceae	Ravensara aromatica Sonn.; Agathophyllu m aromaticum (Sonn.) Willd	ravensara	ravensare aromatique, ravensara aromatica	vrucht	fruit		
Cucumis melo L.	Cucurbitaceae		meloen	melon	vrucht, zaad	fruit, graine		
Cucumis sativus L.	Cucurbitaceae		comcommer	concombre	vrucht	fruit		
Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitaceae		reuzenpompoen	potiron	vrucht	fruit		
Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae		courgette, pompoen, sierpompoen	courge, pépon, citrouille	bloem, vrucht	fleur, fruit		
Cuminum cyminum L.	Apiaceae		komijn	cumin officinal	vrucht	fruit		
Cupressus semperfiriens L.	Cupressaceae		italiaanse cipres	cyprès provençal	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Curcuma longa L.	Zingiberaceae	Curcuma domestica Val., Curcuma domestic Loir., Amomum curcuma Jacq	kurkuma	curcuma, rhizome de curcuma, safran des indes	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consulte z votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Curcuma xanthorrhiza Roxb.	Zingiberaceae		curcuma	curcuma	wortelstok	rhizome		
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe	Zingiberaceae		javaanse curcuma, zedoarwortelstok	safran de java, zedoaire	wortelstok	rhizome		
Cuscuta chinensis Lam.	Convolvulaceae		duivelsnaigaren	cuscuta de chine	zaad	graine		
Cuscuta epithymum Murray	Convolvulaceae		klein warkruid	cuscuta du thym, cuscuta à petites fleurs, petite cuscuta	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.	Leguminosae		guarplant	plante à guar	zaad, gom	graine, gomme		

Cyathula officinalis K.C. Kuan	Amaranthaceae				wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Cyclanthera pedata (L.) Schrad.	Cucurbitaceae		caigua, mexicaanse augurk	caigua, cyclanthe à feuilles digitées	vrucht, blad	fruit, feuille		
Cydonia oblonga Mill.	Rosaceae	Cydonia vulgaris Pers.	kwee	cognassier	vrucht	fruit		
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf	Poaceae		citroengras	citronelle, lemongrass de l'amerique centrale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W.Watson	Poaceae	Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Stapf			bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon jwarancusa subsp. olivieri (Boiss.) Soenarko	Poaceae	Cymbopogon laniger (Desf.) Duthie			bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon martini (Roxb.) Will.Watson	Poaceae		palmarossa	palmarosa	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon nardus (L.) Rendle	Poaceae		citronella	verveine des indes, citronnelle des indes	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.	Poaceae	Andropogon schoenanthus L.	kameelgras		bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor	Poaceae		java citronella	citronelle de java	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cynara cardunculus L.	Compositae		kardoen	cardon	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		
Cynara scolymus L.	Compositae		artisjok	artichaut	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		
Cyperus rotundus L.	Cyperaceae		notengras	souchet rond	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L.	Cytinaceae		gele hypocist		bloem, sap	fleur, jus		
<i>Daemonorops draco</i> (Willd.) Blume	Arecaceae	Daemonorops propinqua Becc.; Calamus draco Willd.			vrucht, hars	fruit, résine		
<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	Compositae	Dahlia variabilis (Willd.) Desf.		dahlia commun	wortel	racine		
<i>Daucus carota</i> L.	Apiaceae		peen	carotte	wortel, zaad	racine, graine		
<i>Dendranthema grandiflorum</i> (Ramat.) Kitam.	Compositae		tuinchrysant	chrysanthème, Chrysanthème d'automne, Chrysanthème horticole	bloem, blad	fleur, feuille		
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae		sofiekruid	l'herbe de sainte sophie	blad, zaad	feuille, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.
<i>Desmodium adscendens</i> DC.			Desmodium	Desmodium	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden dimethyltryptamine derivaten en alkaloïden van het type beta-carboline (type harmane) bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de dérivés de la diméthyltryptamine ni d'alcaloïdes de type bêta-carboline (type harmane)
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Caryophyllaceae		tuinanjer	oeillet des fleuristes	bloem	fleur		
<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	Sapindaceae	Euphoria longan (Lour.) Steud.	longan	longane	zaadmantel, bloem, vrucht	arille, fleur, fruit		
<i>Dioscorea alata</i> L.	Dioscoreaceae			igname ailée, grande igname, cambarre	wortelknol	tubercule	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune

							hoeveelheden alkaloïden bevat	quantité détectable en alcaloïdes.
<i>Dioscorea collettii</i> Hook. f. var. <i>hypoglaucă</i> (Palib.) C. Pei & C. T. Ting	Dioscoreaceae				wortelstok	rhizome		
<i>Dioscorea composita</i> Hemsl.	Dioscoreaceae				wortelknol	tubercule		
<i>Dioscorea oppositifolia</i> L.	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.	yam	yam	wortel, wortelstok	racine, rhizome		
<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea batatas</i> Decne	yamswortel, chinese igname	igname	wortelstok	rhizome		
<i>Dioscorea villosa</i> L.	Dioscoreaceae		wilde yam	igname indigène	wortelknol	tubercule		
<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	Ebenaceae		kaki	kaki, plauqueminier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
<i>Diospyros virginiana</i> L.	Ebenaceae		amerikaanse persimoen	plauquemines de virginie.	vrucht, olie van het zaad	fruit, huile de graine		
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC	Brassicaceae		grote zandkool, wilde rucola	diplotaxis à feuilles étroites	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Caprifoliaceae		grote kaardebol, wilde kaardebol	cabaret des oiseaux, cardère à foulon, bonnetier sauvage, chardon à bonnetier	wortel	racine		
<i>Dipsacus inermis</i> Wall.	Caprifoliaceae	<i>Dipsacus asper</i> Wallich., <i>Dipsacus asperoides</i> C. Y. Cheng et T. M. Ai	sechuan kaardebol, xu duan	xu duan	wortel	racine		
<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	Caprifoliaceae		japanse kaardebol	<i>dipsacus japonicus</i> miq.	wortel	racine		
<i>Dorstenia contrajerva</i> L.	Moraceae				wortel	racine		

<i>Dracocephalum moldavica</i> L.	Lamiaceae			thé des jardins, tête de dragon, mélisse de moldavie	blad, zaad	feuille, graine		
<i>Drimys winteri</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Winteraceae			écorce de winter, foye, canelo	bast	liber		
<i>Drosera anglica</i> Huds.	Droseraceae	<i>Drosera longifolia</i> L.	lange zonnedauw	rossolis d'angleterre, rossalis à feuilles longues	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Droseraceae		kleine zonnedauw	Droséra intermédiaire	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
<i>Drosera peltata</i> Thunb.	Droseraceae				bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
<i>Drosera ramentacea</i> Burch ex DC	Droseraceae				hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Droseraceae		ronde zonnedauw	droséra, rossolis à feuilles rondes	bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
<i>Dunaliella salina</i> (Dunal) Teodoresco	Dunaliellaceae	<i>Haematococcus salinus</i> Dunal						

Durvillea antartica (Chamisso) Hariot	Durvillaeaceae	Fucus antarcticus Chamisso			thallus	thallus		
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	Chenopodium botrys L.	druifkruid		bloeiwijzen	inflorescences	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en ascaridole.
Echinacea angustifolia DC.	Echinacea		kogelbloem, rode zonnebloem	échinacée à feuilles étroites	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2,4 g gedroogde wortel.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2,4 g de racine séchée.
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.	Compositae		bleekbladige zonnehoed	échinacée pâle	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 720 mg gedroogde wortel.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou rhizome : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 720 mg de racine séchée.
Echinacea purpurea (L.) Moench	Compositae		purperen rudbeckia, rode zonnehoed	échinacée pourpre	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2 g gedroogde kruid.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2 g d'herbe séchée.

Echium plantagineum L.	Boraginaceae		slangenkruid	vipérine faux-plantain	olie van het zaad	huile de la graine	Het gehalte aan toxiche pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn. Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg. Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Eisenia bicyclis (Kjellman) Setchell	Lessoniacae		arame	aramé	thallus	thallus		
Elaeis guineensis Jacq.	Arecaceae		oliepalm	palmier à huile d'afrique	olie van de pit	huile de noyaux		
Elettaria cardamomum (L.) Maton.	Zingiberaceae		echte kardemom, kardoem	cardamome	zaad	graine		
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim	Araliaceae	Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms.	Siberische ginseng	eleuthérocoque	wortel	racine		
Elymus repens (L.) Gould	Poaceae	Agropyron repens (L.) P. Beauv.	kweek, graswortel chident commun, chident rampant	chiendent commun, chiendent rampant	wortelstok	rhizome		
Embelia ribes Burm.f.	Primulaceae				wortel, blad, vrucht	racine, feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Epilobium angustifolium L.	Onagraceae		gewoon wilgenroosje	epilobe en épi, epilobe à feuilles étroites	bovengrondse delen	parties aériennes		
Epilobium parviflorum Schreb.	Onagraceae		viltige bastwezerik, kleinbloemig wilgeroosje	epilobe à petites fleurs	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Equisetum arvense L.</i>	Equisetaceae		heermoes	prèle des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Equisetum fluviatile L.</i>	Equisetaceae		holpijp	prèle des eaux	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Equisetum hyemale L.</i>	Equisetaceae		schaafstro	prèle d'hiver	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Equisetum telmateia Ehrh.</i>	Equisetaceae		reuzenpaardenstaart	grande prèle, grande queue-de-cheval	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Erica cinerea L.</i>	Ericaceae		rode dophei	bruyère cendrée	bloeiwijze	inflorescences		
<i>Erica tetralix L.</i>	Ericaceae		gewone dophei	bruyère quaternée, bruyère à quatre angles, caminet	bloem	fleur		
<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	Rosaceae		japanse mispel, loquat	néflier du japon, bibassier	blad, zaad	feuille, graine		
<i>Eriodictyon californicum (Hook. et Arn.) Torr.</i>	Boraginaceae		heilig kruid, yerba sancta	herbe sainte	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Erodium cicutarium L 'Hérit.</i>	Geraniaceae		gewone reigersbek	bec-de-cigogne commun, erodium à feuilles de ciguë	hele plant	plante entière		
<i>Eruca vesicaria L. Cav.</i>	Brassicaceae	<i>Eruca sativa Mill.</i>	Rucola, raketsla	roquette	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.
<i>Eryngium campestre L.</i>	Apiaceae		echte kruisdistel	panicaut champêtre, chardon roulant	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Eschscholtzia californica Cham.</i>	Papaveraceae		slaapmutsje	eschscholzia de californie, pavot jaune de californie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Eucalyptus dives Schauer</i>	Myrtaceae		pepermunt eucalyptus	eucalyptus mentholé	blad, twijg	feuille, brindille		
<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Myrtaceae		eucalyptusboom, koortsboom	eucalyptus, arbre à fièvre, gommier bleu	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
<i>Eucalyptus odorata Behr</i>	Myrtaceae				blad	feuille		

<i>Eucalyptus radiata</i> Sieber ex DC.	Myrtaceae			eucalyptus radié	blad	feuille		
<i>Eucalyptus smithii</i> R.T.Baker	Myrtaceae				schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
<i>Eucheuma horridum</i> J. Agardh	Solieriaceae				thallus	thallus		
<i>Eucheuma spinosum</i> J. Agardh.	Solieriaceae				thallus	thallus		
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	Eucommiaceae		gutta-percha boom, chinese rubberboom	arbre à gutta- percha	schors	écorce		
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae		surinaamse kers	ceriser de cayenne	schors, bloem, vrucht, blad	écorce, fleur, fruit, feuille		
<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	Orobanchaceae	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	beklierde ogentroost	euphraise glanduleuse	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm.	Orobanchaceae		stijve ogentroost, ogentroost	euphraise raide, euphraise glanduleuse, casse- lunettes	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	Arecaceae		açaí	açaí	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	Parmeliaceae		eikmos, gewoon geweimos	evernia, lichen de chêne, mousse de chêne	thallus	thallus		
<i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Schult.	Rubiaceae				schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav	Solanaceae				hele plant	plante entière		
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Polygonaceae	<i>Polygonum fagopyrum</i> L.	gewone boekweit	sarrasin commun, blé noir	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae		gewone beuk	hêtre commun	schors, knop, vrucht	ecorce, bourgeon, fruit		
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Dec.	Polygonaceae	<i>Polygonum cuspidatum</i> Siebold & Zucc.	japanse duizendknoop	renouée du japon, reynoutria du japon	hele plant	plante entière		
<i>Ferula assa-foetida</i> L.	Apiaceae		duivelsdrek	ase fétide	wortel, gomhars	racine, gomme-résine		
<i>Ficus benghalensis</i> L.	Moraceae		banyan	figuier des banians, banian de l'inde	schors, vrucht	écorce, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae		vijg	figuier comestible	hele plant	plante entière		
<i>Ficus religiosa</i> L.	Moraceae		bodhiboom	figuier des pagodes, arbre de la bodhi, pipal	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim	Rosaceae	<i>Spirea ulmaria</i> L.	moerasspirea, geitenbaard	reine-des-prés, ulmaire, barbe de bouc	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en	L'étiquetage doit comporter les avertissement suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser

							adolescenten onder 18 jaar.	chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.	Rosaceae		knolspirea	spirée filipendule	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissement suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Apiaceae		venkel	fenouil	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragole hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragole supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans.
<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Oleaceae		forsythia	forsythia	vrucht, blad, wortel	fruit, feuille, racine		
<i>Fragaria × ananassa</i> (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier	Rosaceae		aarbei	fraiser	hele plant	plante entière		
<i>Fragaria vesca</i> L.	Rosaceae		bosaardbei	fraisier sauvage, fraisier des bois	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Fragaria viridis</i> Weston	Rosaceae		heuvelaardbei	fraisier des collines, fraisier vert	hele plant	plante entière		
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Rhamnaceae	Frangula dodonei Ard., <i>Rhamnus frangula</i> L.	sporkehout, vuilboom	bourdaine, frangule	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion

							anthranoïden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : -Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'anthranoïdes totaux* (exprimés en glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissemens suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Frangula purshiana Cooper	Rhamnaceae	Rhamnus purshiana DC.	cascara	cascara, écorce sacrée	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en cascaroside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissemens suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

							dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Oleaceae		gewone es	frêne commun	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Oleaceae		pluim-es, manna-es	frêne à fleurs, frêne à manne	blad, manna	feuille, manne		
<i>Fucus serratus</i> L.	Fucaceae		zaagwier	varech denté	thallus	thallus		
<i>Fucus vesiculosus</i> L.	Fucaceae		fucus, blaaswier	fucus, varech vésiculeux	thallus	thallus		
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Papaveraceae		gewone duivekervel	fumeterre officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	Lamiaceae	Galeopsis ochroleuca Lam.	bleekgele hennepnetel	galéopsis des champs, chanvre bâtarde	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Galium aparine</i> L.	Rubiaceae		kleefkruid	gaillet gratteron, rièble, grateron, gratté-langue, gaille	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Galium mollugo</i> L.	Rubiaceae		glad walstro	caille-lait blanc, gaillet mou	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Rubiaceae	Asperula odorata L.	lievevrouwebedstro	on la connaît aussi sous les noms de "rièble", "grateron", "gratte-langue", "gaille".	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Galium verum</i> L.	Rubiaceae		geel walstro	gaillet jaune, caille-lait jaune	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Garcinia × mangostana</i> L.	Clusiaceae		mangostan	mangoustanier	vrucht	fruit		
<i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Roxb..	Clusiaceae	Garcinia cambogia (Gaertn) Desr.	guttegomboom	guttier	gomhars	gommer-sine		
<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	Rubiaceae	Gardenia augusta (L.) Merr.	gardenia	gardénie commun, jasmin du cap	hele plant	plante entière		
<i>Gastrodia elata</i> Blume	Orchidaceae				hele plant	plante entière		
<i>Gaultheria procumbens</i> L.	Ericaceae		liggende bergthee	gaulthérie du canada	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Gelidium amansii</i> J.V. Lamouroux	Gelidiaceae				thallus	thallus		
<i>Gelidium sesquipedale</i> (Clemente) Thuret	Gelidiaceae		agar agar	agar agar	thallus	thallus		
<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentianaceae		gele gentiaan	grande gentiane, gentiane jaune	wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Geranium maculatum</i> L.	Geraniaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Geranium pratense</i> L.	Geraniaceae		beemdoovievaarsbek	géranium des prés	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae		robertskruid	géranium herbe à robert	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Geraniaceae		bloedooievaarsbek	géranium sanguin, herbe à becquet	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Geum rivale</i> L.	Rosaceae		knikkend nagelkruid	benoîte des ruisseaux, benoîte des ruisseaux	hele plant	plante entière		
<i>Geum urbanum</i> L.	Rosaceae		geel nagelkruid	benoîte commune	hele plant	plante entière		
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae		ginkgo	ginkgo, arbre des pagodes, arbre aux quarante écus	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van flavonolglycosiden hoger dan 21,6 mg en van terpeenlactonen hoger dan 5,4 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de glycosides de flavonol supérieure à 21,6 mg et de lactones terpéniques supérieure à 5,4 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissemens suivants : Consulter votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

Glycine max (L.) Merr.	Leguminosae		soja	soja	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Glycyrrhiza glabra L.	Leguminosae		zoethout	régisse	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC.	Leguminosae		chinees zoethout	régisse de l'oural, régisse de sibérie	wortel, wortelstok, stolon	racine, rhizome, stolon	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analyseresultaten moeten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent

							beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.
Gossypium herbaceum L.	Malvaceae		katoenplant, oosters katoen	cotonnier	pilus, wortel, zaad	pilus, racine, graine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden gossypol bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.
Gossypium hirsutum L.	Malvaceae		behaarde katoen	coton mexicain	zaad	graine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden gossypol bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.
Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham	Gracilariacae		knoopwier		thallus	thallus		
Grindelia camporum Greene	Compositae		gomplant	grindélia	bovengrondse delen	parties aériennes		
Grindelia hirsutula Hook. & Arn.	Compositae	Grindelia humilis Hook & Ar.			bovengrondse delen	parties aériennes		
Grindelia robusta Nutt.	Compositae		grindelia	grindélia robuste	bovengrondse delen	parties aériennes		
Grindelia squarrosa (Pursh) Dun.	Compositae		grindelia	grindélia	bovengrondse delen	parties aériennes		
Guaiacum officinale L.	Zygophyllaceae		guajakhout, echt pokhout	bois de gaiac	schors, hout	écorce, bois		
Guaiacum sanctum L.	Zygophyllaceae		guajakhout, pokhout	bois de gaiac	schors, hout	écorce, bois		

Guazuma ulmifolia Lamk.	Malvaceae			bois de hêtre, bois d'homme, bois d'orme	schors, blad, vrucht, zaad	écorce, feuille, fruit, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino	Cucurbitaceae		jiaogulan	jiaogulan, herbe de l'immortalité	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Gypsophila paniculata L.	Caryophyllaceae		pluimgipskruid	gypsophile paniculée	wortel	racine		
Haematococcus pluvialis Flotow	Haematococcace ae		bloedregenalg	haematococcus pluvialis	éencellige alg	algue unicellulaire		
Haematoxylum campechianum L.	Leguminosae		campechehout	bois de campêche	ongefermentee rd kernhout	duramen non fermenté		
Hamamelis virginiana L.	Hamamelidaceae		virginische toverhazelaar	hamamélis de virginie	schors, blad	écorce, feuille		
Haplopappus baylahuen Remy	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.	Pedaliaceae		duivelsklauw	griffe du diable	secundaire wortelknol	tubercule secundaire	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal iridoïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'iridoïdes totaux (exprimés en harpagoside)

							moet de volgende waarschuwing bevatten : niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.	supérieure à 40 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.
Harpagophytum zeyheri Decne.	Pedaliaceae			griffe du diable, plante-grappin, araignée de bois	wortel, worteknol	racine, tubercule	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal iridoïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'iridoïdes totaux (exprimés en harpagoside) supérieure à 40 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.
Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen	Amaranthaceae	Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze	braziliaanse ginseng	suma, le ginseng brésilien, pfaffia	wortel	racine		
Hedeoma pulegioides (L.) Pers.	Lamiaceae		hedeoma	hédéome	bovengrondse delen	parties aériennes		
Hedera helix L.	Araliaceae		klimop	lierre	blad	feuille	Enkel de volgende preparaten zijn toegelaten, in overeenstemming met de volgende maximale dagelijkse dosis: a) droog extract (DER 4-8:1), extractie solvent	Seules les préparations suivantes sont autorisées, avec les doses journalières maximales correspondantes : a) extrait sec (DER 4-8:1), solvant

						ethanol 24-30% m/m b) droog extract (DER 6-7:1), extractie solvent ethanol 40% m/m c) droog extract (DER 3-6:1), extractie solvent ethanol 60% m/m d) vloocibaar extract (DER 1:1), extractie solvent ethanol 70% v/v e) soft extract (DER 2.2-2.9:1), extractie solvent ethanol 50% v/v: propylene glycol (98:2)	d' extraction éthanol 24-30% m/m b) extrait sec (DER 6-7:1), solvant d' extraction éthanol 40% m/m c) extrait sec (DER 3-6:1), solvant d' extraction éthanol 60% m/m d) extrait fluide (DER 1:1), solvant d' extraction éthanol 70% v/v e) extrait mou (DER 2.2-2.9:1), solvant
						Maximale dagelijkse dosis : Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen : a) 31 mg b) 29 mg c) 46 mg d) 210 mg e) 84 mg  Kinderen van 6 tot 11 jaar : a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg  Kinderen van 3 tot 5 jaar : a) 16 mg b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg	Doses journalières maximales : Adolescents à partir de 12 ans et adultes : a) 31 mg b) 29 mg c) 46 mg d) 210 mg e) 84 mg  Enfants de 6 à 11 ans : a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg  Enfants de 3 à 5 ans : a) 16 mg

								b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg
Hedychium coronarium J. Koenig	Zingiberaceae				bloem, wortelstok	fleur, rhizome		
Helianthus annuus L.	Compositae		gewone zonnebloem	tournesol commun, grand soleil	bovengrondse delen	parties aériennes		
Helianthus tuberosus L.	Compositae		aardpeer	topinambour, hélianthe tubéreux	knol	tubercule		
Helichrysum arenarium (L.) Moench.	Compositae		strobloem, zandstrobloem	immortelle des sables	bovengrondse delen	parties aériennes		
Helichrysum italicum (Roth.) G. Don.	Compositae		kerrieplant	immortelle d'italie	bovengrondse delen	parties aériennes		
Helichrysum stoechas (L.) Moench	Compositae		gele strobloem	immortelle stoechade	bovengrondse delen	parties aériennes		
Heracleum sphondylium L.	Apiaceae		gewone berenklauw	berce commune	hele plant	plante entière		
Herniaria glabra L.	Caryophyllaceae		kaal breukkruid	herniaire glabre	hele plant	plante entière		
Herniaria hirsuta L.	Caryophyllaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Hesperis matronalis L.	Brassicaceae		damastbloem	julienne des dames, girarde, giroflée des dames, violette de damas, aragone	bovengrondse delen	parties aériennes		
Hibiscus sabdariffa L.	Malvaceae		roselle, jamaïcazuring	carcadé, oseille de guinée, oseille rouge, roselle, bissap	tak, bloem, blad, zaad	rameau, fleur, feuille, graine		
Hieracium pilosella L.	Compositae		muizenoor	epervière piloselle	bovengrondse delen	parties aériennes		
Hierochloe odorata (L.) Beauv.	Poaceae	Hierochloe odorata (L.) Wahl.	veenrekgras	hierochloë odorante	bovengrondse delen	parties aériennes		
Himanthalia elongata (L.) S.F. Gray	Himanthaliaceae		riemwier	spaghetti de la mer, haricot de mer	thallus	thallus		
Hippophae rhamnoides L.	Eleagnaceae		duindoorn	argousier	vrucht, olie van de bes	fruit, huile de baies	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant :

							Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Hizikia fusiformis</i> (Harvey) Okamura	Sargassaceae		hai zao	hai zao, hijiki, hiziki	thallus	thallus		
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Poaceae		incl. gewone gerst, zesrijige gerst	incl. orge carrée, orge à six rangs, escourgeon	zaad, wortel, scheut	graine, racine, germe		
<i>Houttuynia</i> <i>cordata</i> Thunb.	Saururaceae				hele plant	plante entière		
<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae		hop	houblon	bloeiwijzen	inflorescenc es	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van 8-prenylnaringenine hoger dan 400 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de 8-prénarylarnagine supérieure à 400 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	Lycopodiaceae	<i>Lycopodium</i> <i>serratum</i> Thunb.			bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Hydrastis</i> <i>canadensis</i> L.	Ranunculaceae		canadese geelwortel	hydraste du canada	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
<i>Hygrophila</i> <i>auriculata</i> (Schumach.) Heine	Acanthaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
<i>Hymenaea</i> <i>courbaril</i> L.	Leguminosae		lokusboom, gomcopal	courbaril	schors, fruit, blad, zaad, hars	écorce, fruit, feuille,		

						graine, résine		
<i>Hypericum perforatum L.</i>	Hyperaceae		sint-janskruid	millepertuis perforé, millepertuis commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van hypericine hoger dan 700 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen uw arts of apotheker informeren.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'hypericine supérieure à 700 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Informez votre médecin ou pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments.
<i>Hyssopus officinalis L.</i>	Lamiaceae		hyssop	hysope	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Ilex paraguariensis A. St.-Hil.</i>	Aquifoliaceae		mate	maté	blad	feuille		
<i>Illicium verum Hook. f.</i>	Schisandraceae		chinese steranijs	anis étoilé de chine	schors, vrucht	écorce, fruit		
<i>Impatiens balsamina L.</i>	Balsaminaceae		tuinbalsemien	balsamine des gardins	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Indigofera tinctoria L.</i>	Leguminosae		indigostruik	indigotier	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité déetectable en indospicine.
<i>Inula britannica L.</i>	Compositae		engelse alant	inule des fleuves, inule britannique	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Inula helenium L.</i>	Compositae		griekse alant	inule grande aunée	blad, wortelstok, wortel	feuille, rhizome, racine		
<i>Ipomoea batatas (L.) Poir</i>	Convolvulaceae		zoete aardappel	patate douce	knol	tubercule		

<i>Isatis tinctoria</i> L.	Brassicaceae		wede	pastel	bovengrondse delen, sap	parties aériennes, jus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indirubine bevat.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitriné supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indirubine.
<i>Jasminum grandiflorum</i> L.	Oleaceae		grootbloemige jasmijn	jasmin à grandes fleurs	bloem	fleur		
<i>Jasminum officinale</i> L.	Oleaceae		gewone jasmijn	jasmin commun	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Jateorhiza palmata</i> (Lam.) Miers	Menispermaceae	Menispermum palmatum Lam.	kolombo, calumbo	racine de colombo	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
<i>Juglans cinerea</i> L.	Juglandaceae		witte walnoot, boternoot	noyer cendré, noyer blanc, noyer à beurre	zaad	graine		
<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae		okkernoot	noyer royal	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Jumellea fragrans</i> (Thouars) Schltr.	Orchidaceae				blad	feuille		
<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae		gewone jeneverbes	genévrier commun	vrucht, blad, hout	fruit, feuille, bois	Voor voedingssupplementen met	Pour les compléments alimentaires avec

							bereidingen van de vrucht : De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies (maximum 6 weken). Niet gebruiken bij nierfunctiestoornissen.	des préparations de la fruit : L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste (maximum 6 semaines). Pas d'utilisation en cas d'insuffisance rénale.
<i>Justicia adhatoda</i> L.	Achanthaceae	<i>Adhatoda vasica</i> Nees	malabarnoot, adulsa, arusa	noix de malabar	hele plant	plante entière		
<i>Justicia pectoralis</i> Jacq.	Acanthaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Kaempferia galanga</i> L.	Zingiberaceae		kentjoer		wortelstok	rhizome		
<i>Kavalama urens</i> (Roxb.) Raf.	Malvaceae	<i>Sterculia urens</i> Roxb.			gom	gomme		
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Plantaginaceae		eironde leeuwenbek	linaire bâtarde	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Caprifoliaceae		beemdkroon	knautie des champs, scabieuse des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Krameriaceae	<i>Krameria triandra</i> Ruiz & Pav.	ratanhia	ratanhia	wortel	racine		
<i>Lactuca indica</i> L.	Compositae		chinese sla		bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lactuca sativa</i> L.	Compositae		sla	aitue, laitue cultivée, salade	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	Lythraceae		banaba	lilas des indes, queens crape myrtle, banaba	blad	feuille		
<i>Laminaria digitata</i> (Hudson) J.V. Lam.	Laminariaceae		gladgesteeld vingerwier	laminaire digitée	thallus	thallus		
<i>Laminaria hyperborea</i> (Gun.) Foslie	Laminariaceae		ruwgesteeld vingerwier	laminaire hyperboréale, goemon rouge	thallus	thallus		

<i>Laminaria japonica</i> J.E. Areschoug	Laminariaceae		kelp	Laminaire	thallus	thallus		
<i>Laminaria palmata</i> Bory de St.Vincent	Laminariaceae				thallus	thallus		
<i>Lamium album L.</i>	Lamiaceae		witte dovenetel	lamier blanc	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Larix decidua Mill.</i>	Pinaceae		europese lork, lork	mélèze d'europe, mélèze, mélèze commun	bovengrondse delen, hars	parties aériennes, résine		
<i>Larix occidentalis Nutt.</i>	Pinaceae		west amerikaanse lork	mélèze de l'ouest	hele plant	plante entière		
<i>Laurus nobilis L.</i>	Lauraceae		laurierboom	laurier-sauce	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.</i>	Lamiaceae		lavendel	lavande	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lavandula angustifolia Mill.</i>	Lamiaceae	Lavandula angustifolia subsp. angustifolia, <i>Lavandula officinalis</i> Chaix, <i>Lavandula spica L.</i>	lavendel	lavande	bloeiende top	sommités fleuries		
<i>Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica (DC.) Guinea</i>	Lamiaceae	<i>Lavandula vera DC.</i>	lavendel	lavande des pyrénées	bloeiende top	sommités fleuries		
<i>Lavandula latifolia</i> Medik	Lamiaceae	<i>Lavandula hybrida</i> E.Rev. ex Briq.	breedbladige lavendel, spijklavendel	lavande aspic	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lavandula stoechas L.</i>	Lamiaceae		franse lavendel	lavande stéchade, lavande papillon, lavande à toupet	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lawsonia inermis</i> L.	Lythraceae		henna	henné	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
<i>Ledum palustre L.</i>	Ericaceae		moerasrozemarijn; moeraspalm	lédon, lédum des marais	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Lens culinaris</i> Medik.	Leguminosae		linze	lentille cultivée	zaad	graine		
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Lamiaceae		hartgespan	agripaume	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension.
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	Lamiaceae	<i>Leonurus artemisia</i> (Lour.) S.Y.Hu, <i>Leonurus heterophyllus</i> Sweet			bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension.
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Brassicaceae		veldkruidkers	passerage champêtre	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreïdie of onder schildklier	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un

							behandeling, uw arts raadplegen.	traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Lepidium latifolium L.</i>	Brassicaceae		peperkers	grande passerage, passerage à feuilles larges	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyreïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Lepidium meyenii Walp.</i>	Brassicaceae	<i>Lepidium peruvianum</i> G. Chacón de Popovici	maca	maca	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloïden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
<i>Lepidium sativum L.</i>	Brassicaceae		tuinkers	cresson alénois, passerage cultivé	hele plant	plante entière		
<i>Leptospermum petersonii</i> subsp. <i>petersonii</i> .	Myrtaceae	<i>Leptospermum citratum</i> (J.F.Bailey & C.T.White) Challinor, Cheel & A.R.Penfold			bloeiende toppen	sommités fleuries		
<i>Leptospermum scoparium</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Myrtaceae		manuka	manuka	schors, blad	écorce, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Lespedeza capitata</i> Michx.	Leguminosae		lespedeza	lespedeza	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam.	Compositae		gewone margriet	marguerite, marguerite commune	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Levisticum officinale</i> W.D.J. Koch	Apiaceae		lavas	céleri perpétuel, livèche, herbe-à-maggi	hele plant	plante entière		

<i>Ligusticum striatum</i> DC.	Apiaceae	<i>Ligusticum chuanxiong</i> S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu. <i>Ligusticum wallichii</i> Franch.			wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens zwangerschap.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indospicine. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Lilium brownii</i> F.E. Br. ex Miellez	Liliaceae				bol	bulbe	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloïden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	Lauraceae				wortel	racine		
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaceae		gekweekt vlas	lin cultivé	zaad	graine		
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Altingiaceae		amerikaanse amberboom	copalme d' amérique	schors	écorce		
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	Sapindaceae		lychee	litchi, letchi	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Lithothamnion calcareum</i> (Pallas) Areschoug	Hapalidiaceae		<i>lithothamnium calcareum</i>	lithothamne	thallus	thallus		
<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	Lauraceae				vrucht	fruit		
<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	Lobariaceae		longenmos	pulmonaire	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit

								fini ne peut pas dépasser 3 %.
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae		japanse kamperfoelie	chèvrefeuille du japon	bloem, steel	fleur, tige		
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Leguminosae		gewone rolklaver	lotier corniculé	hele plant	plante entière		
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L.	Leguminosae		gewone rolklaver	lotier corniculé	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Luma chequen</i> (Molina) A.Gray	Myrtaceae	Eugenia chequen Mol.			blad	feuille		
<i>Lycium barbarum</i> L.	Solanaceae	<i>Lycium halimifolium</i> Mill.	boksdoorn	lyciet commun, lyciet de barbarie	vrucht	fruit		
<i>Lycium chinense</i> Mill.	Solanaceae		chinese boksdoorn	lyciet de chine	vrucht	fruit		
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) H. Karst.	tomaat	tomate	vrucht	fruit		
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopodiaceae		grote wolfsklauw	lycopode en massue	bovengrondse delen, spoor	Parties aériennes, spore		
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lamiaceae	<i>L. mollis</i> A.Kern., <i>Lycopus menthifolius</i> Mabille	wolfspoot	lycope, lycopé d'europe, chanvre d'eau	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Lycopus virginicus</i> Michx.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou

							onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Primulaceae		grote wederik	lysimaque commune, grande lysimaque	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae		grote kattenstaart	salicaire commune	toppen	sommité	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Macadamia ternifolia</i> F. Muell	Proteaceae		macadamianoten	noyer du queensland	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Macrocytis pyrifera</i> (L.) C.Ag.	Laminariaceae		kelp	kelp	thallus	thallus		
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliaceae	<i>Michelia champaca</i> L.			bloem	fleur		
<i>Magnolia officinalis</i> Rehder & Wilson	Magnoliaceae		magnolia	magnolia officinal	schors, bloem	écorce, fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Malpighia glabra</i> L.	Malpighiaceae	<i>Malpighia punicifolia</i> L.	west-indische kers, barbadoskers	cerise de barbade, acérola	vrucht	fruit		
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i> (L.)	eetappel	pommier commun	hele plant	plante entière		

		Mill. var. domestica (Borkh.) Mansf						
<i>Malus pumila</i> Mill.	Rosaceae		paradijsappelboom	pommier paradis	knop, bloem, vrucht, blad	bourgeon, fleur, fruit, feuille		
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i>	Rosaceae		wilde appel	pommier sauvage	knop, bloem, vrucht, blad	bourgeon, fleur, fruit, feuille		
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae		groot kaasjeskruid, wilde malve	mauve sauvage, fromageon, petit fromage, fouassier	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Mammea americana</i> L.	Calophyllaceae		amerikaanse mammi-appel	abricotier des antilles, abricotier- pays	pulp van de vrucht	pulpe du fruit		
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae		mango	manguier	hele plant	plante entière		
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	Eupharbiaceae		cassave, maniok	manioc	gekookte wortel	racine cuite		
<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen	Sapotaceae	Achras sapota L.	sapodilla	sapotillier	vrucht, bloem	fruit, fleur		
<i>Maranta arundinacea</i> L.	Marantaceae		pijlwortel	marante, dictame, herbe aux flèches	bol, wortelstok	buble, rhizome		
<i>Marchantia polymorpha</i> L.	Marchantiaceae		parapluutjesmos	hépatique des fontaines	thallus	thallus	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Lamiaceae		malrove	marrube	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Marsdenia cundurango</i> Rchb.f.	Apocynaceae	<i>Marsdenia reichenbachii</i> Triana	condurango	condurango	schors	écorce		
<i>Marsdenia sylvestris</i> (Retz.) P.I.Forst.	Apocynaceae	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz) R.Br.			blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas

							van antidiabetische behandeling.	d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry	Phyllophoraceae		kernwier		thallus	thallus		
Matricaria chamomilla L.	Compositae	Matricaria recutita L., Chamomilla recutita (L.) Rauschert	echte kamille	matricaire camomille, camomille vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de bloem of blad : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van $\alpha$ -bisabolol hoger dan 1,9 mg en van apigenine-7-glucoside hoger dan 5,6 mg.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fleur ou la feuille : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de $\alpha$ -bisabolol supérieure à 1,9 mg et d'apigénine-7-glucoside supérieure à 5,6 mg.
Medicago sativa L.	Leguminosae		luzerne, alfalfa	luzerne commune	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel	Myrtaceae		theeboom, medicinale mirthehei	melaleuca, arbre à thé, mélaleuque	bovengrondse delen	parties aériennes	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.

Melaleuca cajuputi Powell	Myrtaceae		kajapoetboom, cajeputboom	cajeputier	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca leucadendra (L.) L.	Myrtaceae	Melaleuca leucadendron (L.) L.			blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca linariifolia Sm.	Myrtaceae			melaleuque à feuilles linéaires	blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae		niaouli	niaouli	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae		nerolina	nerolina, l'arbre à peau	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melilotus altissimus Thuill.	Leguminosae		goudgele honingklaver, gele honingklaver	grand mélilot	bovengrondse delen	parties aériennes		
Melilotus officinalis (L.) Lam.	Fabaceae		citroengele honingklaver, akkerhoningklaver	mélilot officinal	bloeiende top	sommité fleurie	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Melissa officinalis L.	Lamiaceae		citroenmelisse	mélisse, mélisse officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Melittis melissophyllum L.	Lamiaceae		bijenblad	mélitte à feuilles de mélisse	bovengrondse delen	parties aériennes		
Mentha aquatica L.	Lamiaceae		watermunt, aalkruid, bakkruid,	menthe aquatique	hele plant	plante entière		

			boerenbalsem, vlooienkruid					
<i>Mentha arvensis</i> L.	Lamiaceae		akkermunt	menthe des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Mentha spicata</i> L.	Lamiaceae		aarmunt, groene munt	menthe en épi, menthe verte, menthe douce	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Mentha x piperita</i> L.	Lamiaceae		pepermunt	menthe poivrée	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Mentzelia cordifolia</i> Dombey ex Urb. & Gilg	Losaceae	<i>Mentzelia scabra</i> Kunth			hele plant	plante entière		
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthaceae		waterdrieblad	trèfle d'eau	blad	feuille		
<i>Mesembryanthem um crystallinum</i> L.	Aizoaceae	Gasoul crystallinum (L.) Rothm.; <i>Cryophytum crystallinum</i> (L.) N.E.Br.	ijsplantje, ijskruid	ficoïde glaciale	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van mesembrine alkaloïden hoger dan 90 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes de type mesembrine supérieure à 90 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Mespilus germanica</i> L.	Rosaceae		mispel	néflier, néflier commun	vrucht	fruit		
<i>Mikania amara</i> (Vahl.) Willd.	Compositae				schors, blad	écorce, fruit		
<i>Mitchella repens</i> L.	Rubiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Momordica balsamina</i> L.	Cucurbitaceae				vrucht, blad	fruit, feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière

							hittebehandeling ondergaan.	première doit être traitée à la chaleur.
<i>Momordica charantia L.</i>	Cucurbitaceae		alsempeer, balsempeer, sopropo, bittere augurk, bittere komkommer	concombre amer, margose	vrucht, blad	fruit, feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
<i>Monarda didyma L.</i>	Lamiaceae		bergamot, scharlaken monarda	monarde pourpre, thé d'oswego	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Monarda punctata L.</i>	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Morinda citrifolia L.</i>	Rubiaceae		noni, indische moerbei	noni, pomme-chien	puree en concentraat van vrucht, sap	purée et concentré de fruit, jus	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
<i>Morinda officinalis F.C. How</i>	Rubiaceae				hele plant	plante entière		
<i>Moringa oleifera Lam.</i>	Moringaceae		moringa	moringa	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 500 mg gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 500 mg de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer aux

								enfants de moins de 18 ans.
<i>Morus alba</i> L.	Moraceae		witte moerbei	mûrier blanc	vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae		zwarte moerbei	mûrier noir	knop, steel, schors, vrucht, blad	bourgeon, tige, écorce, fruit, feuille		
<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	Rutaceae		kerrieboom	arbre à curry, calou pilé, murraya	schors, blad, wortel van de volwassen struik	écorce, feuille, racine d'un buisson adulte		
<i>Musa x paradisiaca</i> L. (pro sp.)	Musaceae	<i>Musa x sapientum</i> L.	banaan	bananier	vrucht, blad, wortel	fruit, feuille, racine		
<i>Myrciaria dubia</i> (H.B.K.) McVaugh	Myrtaceae	<i>Psidium dubium</i> H.B.K.	camu camu, rumbes	camu camu, caçari, camo	vrucht	fruit		
<i>Myrica cerifera</i> L.	Myricaceae			arbre à suif, appelé cirier, arbre à cire	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Myrica gale</i> L.	Myricaceae		wilde gagel, was gagel	piment royal, myrte des marais, bois-sent-bon, myrique baumier	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicaceae		nootmuskaatboom	muscadier	foelie, zaad	macis, graine		
<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>balsamum</i> (L.) Harms	Leguminosae		tolubalsemboom	baumier de tolu	schors van de stam	écorce du tronc		
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae		mirt	myrte	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Nardostachys jatamansi</i> (D. Don) DC.	Caprifoliaceae	<i>Nardostachys grandiflora</i> DC.	jatamansi, indisches aarborstelgras, narduskruid	jatamansi, nard indien	hele plant	plante entièvre		
<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Brassicaceae		witte waterkers	cresson de fontaine	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van pulegone hoger dan 3,5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de pulégone supérieure à 3,5 mg.
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbonaceae		lotus, indische lotusbloem, heilige lotus	lotus, lotus des indes, lotus sacré	hele plant	plante entièvre	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Nepeta cataria</i> L.	Lamiaceae		wild kattekruid	herbe aux chats	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Nepeta tenuifolia</i> Benth.	Lamiaceae	<i>Schizonepeta tenuifolia</i> (Benth.) Briq.	japans kattenkruid	chataire japonaise	blad	feuille		
<i>Nephelium lappaceum</i> L.	Sapindaceae		ramboetan	rambouutan, litchi chevelu	vrucht	fruit		
<i>Nigella sativa</i> L.	Ranunculaceae		zwarte komijn	nigelle cultivée, cumin noir	koud geperste olie van het zaad	huile de la graine pressée à froid	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet geraffineerde olie van deze plant bekomen door koude persing is instabiel en hoge	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'huile non raffinée de cette plante obtenue par pression à froid est instable et à

						dossiers zijn niet geschikt voor de consumptie door kwetsbare groepen, met name: kinderen onder 12 jaar, adolescenten onder 18 jaar, zwangere en lacterende vrouwen.	haute dose ne convient pas pour la consommation par des groupes vulnérables notamment : les enfants de moins de 12 ans, les adolescents de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou allaitantes.
Ocimum basilicum L.	Lamiaceae		basilicum, bazielkruid	basilic, basilic commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragole hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.
Ocimum gratissimum L.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragole hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen

							langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivant : Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Ocimum tenuiflorum L.	Lamiaceae	Ocimum sanctum L.	heilige basilicum	basilic sacré	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragole hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragole supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Oenanthe aquatica (L.) Poiret	Apiaceae		watertorkruid, watervenkel	oenanthe phellandre, fenouil d'eau, oenanthe aquatique	rijpe vrucht	fruit mûr		
Oenothera biennis L.	Onagraceae		middelste teunisbloem	onagre bisanuelle	zaad	graine		
Olea europaea L.	Oleaceae		olijfboom	olivier	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille		
Olea europaea L. subsp. europaea	Oleaceae		olijfboom	olivier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Ononis spinosa L.	Leguminosae	Ononis vulgaris "Rouy, p.p.C"	kattedoorn	bugrane épineuse, arrête-bœuf	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40

							analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>hircina</i> (Jacq.) Gams	Leguminosae	<i>Ononis arvensis</i> L.	wild zoethout, stalkruid	bugrane des champs	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Onopordon acanthium</i> L.	Compositae		wegdistel	chardon aux ânes, onopordon fausse-acanthe	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	Asparagaceae		japanse slangenbaard	barbe de serpent, muguet du japon	knol	tubercule	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Opopanax chironius</i> (L.) W.D.J.Koch	Apiaceae		opopanax	opopanax, opopanax de chiron	hele plant, gomhars	plante entière, gomme-résine		
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae		vijgcactus	ponce, figuier de barbarie	cladode, bloem, vrucht	cladode, fleur, fruit		
<i>Orchis mascula</i> L.	Orchidaceae		mannetjesorchis	orchis mâle	wortelknol	tubercule		
<i>Origanum compactum</i> Bentham	Lamiaceae		origano	origan	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Origanum dictamnus</i> L.	Lamiaceae		hopmarjolein, kandische majoraan	dictame de crète	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Origanum majorana</i> L.	Lamiaceae	Majorana hortensis Moench.	marjolein, majoraan	marjolaine, amarique	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Origanum vulgare</i> L.	Lamiaceae		wilde marjolein, orego	origan, origan vulgaire, marjolaine sauvage	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.	Lamiaceae		javaanse nierthee	thé de java, moustaches de chat	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5,5 g gedroogde bladeren.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 5,5 g de feuilles séchées.
<i>Orthosiphon aristatus</i> var. <i>aristatus</i>	Lamiaceae		kattensnor	moustaches de chat	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Oryza sativa</i> L.	Poaceae		rijst	riz	zaad, wortel	graine, racine		
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Oxalidaceae		witte klaverzuring	oseille des bois	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Malvaceae		watercacao	marce, noisetier de la guyane, noix de malabar, arbre à monnaie	blad, zaad	feuille, graine		
<i>Pachira insignis</i> (SW.) Savigny	Malvaceae				zaad	graine		
<i>Padus avium</i> var. <i>avium</i>	Rosaceae	<i>Prunus padus</i> L.	gewone vogelkers	cerisier à grappes, merisier à grappes	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalents (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	Paeoniaceae	<i>Paeonia</i> albiflora Pall., <i>Paeonia</i>	chinese pioen	pivoine blanche, pivoine commune	bloem, wortel, zaad	fleur, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas

		chinensis L. Vilmorin					gebruiken tijdens de zwangerschap.	utiliser en cas de grossesse.
Paeonia officinalis L.	Paeoniaceae		boerenpionen	pivoine officinale	bloem, wortel	fleur, racine		
Paeonia x suffruticosa Andrews	Paeoniaceae		boompionen	pivoine en arbre	wortel	racine		
Palmaria palmata (Linnaeus) Weber & Mohr	Palmariacae	Fucus palmatus L., Rhodymenia palmata (L.) Greville	rood lapwier	rhodymenie palmé	thallus	thallus		
Panax ginseng C.A. Mey.	Araliaceae		ginseng	ginseng, mandragore coréenne	wortel, blad, bes	racine, feuille, bes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panax notoginseng (Berkill) F.H. Chen.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panax pseudoginseng Wall.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Panax quinqefolius L.	Araliaceae		amerikaanse ginseng	ginseng américain	wortel, blad, zaad	racine, feuille, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panicum miliaceum L.	Poaceae		pluimgierst	millet commun, mil, millet cultivé, panic, panic millet	bloem, vrucht	fleur, fruit		
Panzerina lanata (L.) Soják	Leguminosae	Panzeria lanata (L.) Bunge.			bovengrondse delen	parties aériennes		
Papaver rhoeas L.	Papaveraceae		grote klaproos	grand coquelicot	bloem	fleur		
Parietaria officinalis L.	Urticaceae		groot glaskruid	pariétaire officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Parmelia saxatilis (L.) Ach.	Parmeliaceae				thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Parthenium hysterocephorus L.	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.	Vitaceae	Ampelopsis tricuspidata Siebold et Zucc.	oosterse wingerd, oosterse wilde wingerd	vigne-vierge à trois pointes	bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssuppleme nten met bereidingen van de jonge scheut: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de jeune pousse: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion

							de hoeveelheid équivalent met 5% gedroogde plant.	supérieure à la quantité équivalente à 5% de plante séchée.
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	<i>Passiflora</i> <i>incarnata</i> L.	passiebloem, passiekruid	passiflore sauvage	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Apiaceae		pastinaak	panais	wortel	racine		
<i>Paullinia cupana</i> Kunth	Sapindaceae		guarana	guarana	zaad	graine		
<i>Pedalium murex</i> L.	Pedaliaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Pelargonium</i> <i>graveolens</i> L'Herit	Geraniaceae		rozenpelargonium, rozengeranium	pélargonium à forte odeur	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Pelargonium</i> <i>radens</i> H.E. Moore	Geraniaceae	<i>Pelargonium</i> <i>radula</i> (Cav.) L'Hér.			bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Pelargonium</i> <i>sidooides</i> DC.	Geraniaceae		geranium	pélargonium	hele plant	plante entière		
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	Lamiaceae		zwarte netel, perilla, japans sesam-zaad	perilla	blad, zaad	feuille, graine		
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae		avocadoboom	avocatier	blad	feuille		
<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp.	Polygonaceae	<i>Polygonum</i> <i>bistorta</i> L.	adderwortel, adderkruid	bistorte, renouée bistorte, serpentaire, feuillote	wortelstok	rhizome		
<i>Persicaria</i> <i>maculosa</i> Gray	Polygonaceae	<i>Polygonum</i> <i>persicaria</i> L.	perzikkruid	renouée persicaire	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Petiveria alliacea</i> L.	Phytolaccaceae		parelhoenkruid	herbe aux poules	blad, wortel	feuille, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Petroselinum</i> <i>crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Apiaceae		tuinpeterselie	persil cultivé	hele plant	plante entière		
<i>Peucedanum</i> <i>ostruthium</i> (L.) W. Koch	Apiaceae		meesterwortel, varkenskervel	impératoire, peucédan officinal	hele plant	plante entière		
<i>Peumus boldus</i> Molina	Monimiaceae		boldo	boldo	blad	feuille		
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Leguminosae		gewone boon	haricot commun	gekookt of geweekt zaad	graine cuite ou trempée		

<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Rutaceae		kurkboom	phellodendron de l'amour, arbre au liège	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Oleaceae			alavert à larges feuilles	blad	feuille		
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	<i>Polypodium leucatomos</i> Poir.	blauwvaren		blad, wortelstok	feuille, rhizome		
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Arecaceae		dadelpalm	palmier dattier, dattier	vruchtvlees	pulpe du fruit		
<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps	Rosaceae	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michaux.) S. Elliott	zwarte appelbes	amélanachier à fruits noirs, aronie à fruits noirs	vrucht	fruit		
<i>Phyla scaberrima</i> (Juss. ex Pers.) Moldenke	Verbenaceae	<i>Lippia dulcis</i> Trev.	azteeks zoetkruid	l'herbe sucrée des Aztèques	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	Phyllanthaceae				bloeiende top	Sommités fleuries	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthaceae	<i>Emblica officinalis</i> Gaertn.	amalaki, amla	amalaki, amla, arbre de malacca	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Phyllanthaceae				hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Phymatolithon calcareum</i> (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin	Hapalidiaceae			lithothamne	thallus	thallus		
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Solanaceae		lampionplant, jodenkers	coqueret, coqueret alkékenge, lanterne chinoise	rijpe vrucht	fruit mûr		
<i>Physalis peruviana</i> L.	Solanaceae		goudbes, ananaskers, incabes, kaapse kruisbes	coqueret du pérou, groseille du cap	rijpe vrucht	fruit mûr		
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	Pinaceae		fijnspar, grote spar	epicéa commun, epicéa, faux sapin, pesse, sapin élevé, sapin rouge	naald, top van de tak	aiguille, bout de branche		
<i>Picramnia antidesma</i> Sw.	Picramniaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en cascaroside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas

							Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.	Myrtaceae	<i>Pimenta officinalis</i> Lindl.	piment, jamaicapeper	poivrier de la jamaïque, piment de la jamaïque	bes	baie		
<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae		west-indische bayboom, bayrumboom, bay st.thomas	piment couronné, bois d'inde	blad	feuille		
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Apiaceae		anijs	anis	zaad	graine		
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Apiaceae		grote bevernel	grand boucage	wortel	racine		
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Apiaceae		kleine bevernel	petit boucage	hele plant	plante entière		
<i>Pinus koraiensis</i> Siebold & Zucc.	Pinaceae		koreaanse den	pin de corée	naald, oliehars, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	Pinaceae				naald, oliehars, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
<i>Pinus mugo</i> Turra	Pinaceae	<i>Pinus montana</i> Mill.	bergden	pin buissonnant, pin mugho	knop, naald, scheut	bourgeon, aiguille, pousses		
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	<i>Pinus maritima</i> Lam.	zeeden	pin maritime, pin des landes	schors, zaad, blad, knop (kegel)	écorce, graine, feuille, bourgeon (cône)		
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae		parasolden	pin parasol, pin pignon	naald, oliehars, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae		grove den	pin sylvestre, pin-sauvage	schors, knop, vrucht, blad, scheut	écorce, bourgeon, fruit, feuille		
<i>Piper aduncum</i> L.	Piperaceae	<i>Piper angustifolium</i> Ruiz & Pav.	maticopeper	matico	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Piper longum</i> L.	Piperaceae		lange peper	poivre long	vrucht	fruit		
<i>Piper nigrum</i> L.	Piperaceae		zwarte peper, witte peper	poivrier noir, poivrier blanc	vrucht, oliehars, olie	fruit, oléorésine, huile		

Pistacia lentiscus L.	Anacardiaceae	Lentiscus vulgaris Fourr., Terebinthus lentiscus (L.) Moench	mastiekboom	lentisque, pistachier lentisque	blad, hars, twijg	feuille, résine, brindille		
Pistacia terebinthus L.	Anacardiaceae		terpentijnboom	pistachier térebinthe, térebinthe	vrucht	fruit		
Pistacia vera L.	Anacardiaceae		pistache, pimpernoot	pistachier, pistachier commun, pistachier cultivé, pistachier vrai	vrucht	fruit		
Pisum sativum L.	Leguminosae		erwt	pois	peul, zaad	gousse, graine		
Plantago afra L.	Plantaginaceae	Plantago psyllium L.	vlozaad, weegbree	plantain psyllium, plantain pucier, herbe aux puces, plantain psyllion, pucier	zaadhuid, zaad	tégument de graine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.
Plantago arenaria Waldst. et Kit.	Plantaginaceae		zandweegbree	plantain de sables	zaad	graine		
Plantago lanceolata L.	Plantaginaceae		smalle weegbree	plantain lancéolé	bovengrondse delen	parties aériennes		
Plantago major L.	Plantaginaceae		grote weegbree	plantain à larges feuilles, grand plantain	bovengrondse delen	parties aériennes		
Plantago media L.	Plantaginaceae		ruige weegbree	plantain intermédiaire, langue d'agneau	hele plant	plante entière		
Plantago orbigniana Steinh. ex Decne.	Plantaginaceae	Plantago ovata Phil.	vlozaad	plantain pucier, plantain des indes	zaad	graine		
Plantago ovata Forssk.	Plantaginaceae	Plantago ispaghula Roxb. ex Fleming	vlozaad	plantain pucier, plantain des indes	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.

<i>Platanus orientalis L.</i>	Platanaceae		oosterse plataan	platane d'Orient	knop	bourgeon		
<i>Platycodon grandiflorus (Jacquin) A. DC.</i>	Campanulaceae		ballonklokje, chineese klokjesbloem, ballonbloem	platycodon à grandes fleurs	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Langdurig gebruik kan de maag irriteren.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'usage prolongé peut irriter l'estomac.
<i>Plectranthus barbatus Andrews</i>	Lamiaceae	<i>Coleus barbatus (Andrews) Benth</i>			blad, wortel, knol	feuille, racine, tubercule	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec des médicaments pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Plukenetia volubilis L.</i>	Euphorbiaceae				olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
<i>Pogostemon cablin (Blanco) Benth.</i>	Lamiaceae		patchoeli	patchouli	blad	feuille		
<i>Polygala senega L.</i>	Polygalaceae		senegawortel, senecawortel, ratelsteelwortel	polygala de virginie, sénéga, laitier, herbe au lait	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
<i>Polygala sibirica L.</i>	Polygalaceae				wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing	L'étiquetage doit comporter l'avertissement

							bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Polygala tenuifolia Willd.	Polygalaceae		siberische vleugeltjesbloem	polygala de chine	wortel	racine		
Polygala vulgaris L.	Polygalaceae	Polygala comosa Schkuhr	gewone vleugeltjesbloem	polygale commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	Liliaceae	Polygonatum officinale All.	welriekende salomonszegel	sceau de salomon odorant	wortelstok	rhizome		
Polygonum aviculare L.	Asparagaceae		varkensgras	renouée des oiseaux, traînasse	bovengrondse delen	parties aériennes		
Populus alba L.	Salicaceae		witte abeel, zilverpopulier	peuplier blanc, peuplier argenté, abèle	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus balsamifera L.	Salicaceae		balsempopulier	peuplier baumier	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser

							adolescenten onder 18 jaar.	chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae		zwarte populier	peuplier noir	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
<i>Populus tremula</i> L.	Salicaceae		ratelpopulier	peuplier tremble	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
<i>Populus tremuloides</i> Michx.	Salicaceae		amerikaanse ratelpopulier	peuplier faux- tremble	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

<i>Porphyra umbilicalis</i> Kützing	Bangiaceae		navelwier, purperwier	nori, porphyre	thallus	thallus		
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae		postelein	pourpier, pourpier potager	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Potentilla anserina</i> L.	Rosaceae		zilverschoon	potentille des oies, potentille ansérine	hele plant	plante entière		
<i>Potentilla argentea</i> L.	Rosaceae		viltganzerik	potentille argentée	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	Rosaceae		tormentil, bloedwortel, zevenblad, zevenvingerkruid	tormentille, potentille dressée, potentille officinale, herbe de sainte catherine	hele plant	plante entière		
<i>Potentilla reptans</i> L.	Rosaceae		vijfvingerkruid	potentille rampante, quintefeuille	wortelstok	rhizome		
<i>Prangos pabularia</i> Lindl.	Apiaceae		prangos	yugan	vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
<i>Primula elatior</i> Hill	Primulaceae		slanke sleutelbloem	primevère élevée, primevère des bois	bloem, wortel	fleur, racine		
<i>Primula veris</i> L.	Primulaceae	<i>Primula officinalis</i> (L.) Hill.	gulden sleutelbloem	primevère officinale	bloem, wortel	fleur, racine		
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Lamiaceae		gewone brunel	brunelle commune	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende	L'étiquetage doit comporter

							waarschuwing bevatten : Niet gebruiken samen met contraceptiva.	l'avertissement suivant : Ne pas utiliser concomitamment avec des contraceptifs.
<i>Prunus africana</i> (Hook. f.) kalkman	Rosaceae	Pygeum <i>africanum</i> Hook. f.	rood stinkhout, afrikaanse kers, pygeum	mueri, pygeum, prunier d'afrique	schors	écorce		
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Rosaceae		abrikoos	abricotier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Rosaceae		zoete kers	merisier, cerisier des oiseaux, cerisier, bigarreauitier	vrucht, steel	fruit, pédoncule		
<i>Prunus cerasus</i> L.	Rosaceae	Cerasus <i>vulgaris</i> Mill.	zure kers	griottier	Fruit (namelijk zaad en pulp), bloemsteel, blad, schors, gom	Fruit (dont graine et pulpe), pédoncule, feuille, écorce, gomme		
<i>Prunus domestica</i> L.	Rosaceae		pruimboom	prunier	schors, knop, bloem, vrucht, blad	écorce, bourgeon, fleur, fruit, feuille		
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb	Rosaceae	Amygdalus <i>communis</i> L., <i>Prunus</i> <i>amygdalus</i> Batsch.	amandelboom	amandier	knop, bladknop, zaad, bloem, vrucht, olie	bourgeon, bourgeon de feuille, graine, fleur, fruit, huile	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	Rosaceae		perzik	pêcher, pêcher commun	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Rosaceae		amerikaanse vogelkers	cerisier tardif	schors, blad	écorce, feuille		
<i>Prunus spinosa</i> L.	Rosaceae		sleedoorn	prunellier, epine noire, prunier épineux	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae		gauva	goyavier	schors, vrucht, blad, wortel	écorce, fruit, feuille, racine	Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (25%) extracten zijn toegelaten.	Seule l'utilisation des extraits aqueux et légèrement alcoolisés (25%) est autorisée.
<i>Psidium guineense</i> Sw.	Myrtaceae	<i>Psidium araca</i> Raddi	braziliaanse guave	goyavier du brésil	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Pterocarpus erinaceus</i> Poir.	Leguminosae			vène	sap van het hout	jus du bois		
<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	Leguminosae				sap van het hout	jus du bois	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Pterocarpus marsupium</i> Roxb.	Fabaceae		kinoboom, sandelboom, bastaardteak	kino de malobar	bloem, kernhout, blad, gomhars	fleur, duramen, feuille, gomme-résine		
<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.	Leguminosae	<i>Pterocarpus draco</i> L.			hars	résine		
<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f.	Leguminosae		rode sandelboom	santal rouge	hout	bois		
<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Sanjappa & Pradeep	Leguminosae	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	kudzu	kudzu	bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles

							voor elk lot van producten.	pour chaque lot de produits.
<i>Pueraria tuberosa</i> (Willd.) DC.	Leguminosae				bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimées en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Gaertn.	Compositae		heelblaadjes	pulicaire dysentérique	hele plant	plante entière		
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Boraginaceae		gevlekt longkruid	pulmonaire officinale	wortel	racine	Het gehalte aan toxiche pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.
<i>Punica granatum</i> L.	Lythraceae		granaatboom	grenadier	bloem, vrucht, zaad	fleur, fruit, graine		
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Ericaceae		rond wintergroen, rondbladig wintergroen	pyrole à feuilles rondes	blad	feuille		
<i>Pyropia tenera</i> (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G.Chi	Bangiaceae	Porphyra tenera Kjellman			thallus	thallus		
<i>Pyrus communis</i> L.	Rosaceae		peer	poirier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
<i>Quercus alba</i> L.	Fagaceae		amerikaanse witte eik	chêne blanc, chêne blanc d'amérique	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		

<i>Quercus coccifera</i> L.	Fagaceae		hulsteik	chêne des garrigues, chêne kermès	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae		steeneik	chêne vert, yeuse	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier	Fagaceae				schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Fagaceae		wintereik	chêne sessile	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Fagaceae		donzige eik	chêne pubescent, chêne blanc	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae		zomereik	chêne pédonculé	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus serrata</i> subsp. <i>serrata</i>	Fagaceae	<i>Quercus glandulifera</i> Blume	chinese eik	chêne à feuilles de chataignier	schors, vrucht, galnoot, blad	écorce, fruit, noix de galle, feuille		
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae		kurkeik	chêne-liège, corcier, surier, sur	schors, vrucht, galnoot, blad	écorce, fruit, noix de galle, feuille		
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillajaceae	<i>Quillaja smegmaderma</i> DC.			schors	écorce		
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i> (Mill.) J.Kern.	knopherik, wilde radijs	ravenelle, radis ravenelle, radis sauvage	hele plant	plante entière		
<i>Raphanus sativus</i> L.	Brassicaceae		tuinradijs	radis cultivé	hele plant	plante entière		
<i>Raphia farinifera</i> (Gaertn.) Hyl.	Arecaceae	<i>Raphia pedunculata</i> P.Beauv.			zetmeel afkomstig van het merg van de scheut	amidon de la moelle de la pousse		

Rehmannia glutinosa (Gaertn.) DC.	Plantaginaceae		chinees vingerhoedskruid	digitale de chine, rehmannia	wortel	racine		
Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke	Polygonaceae	Polygonum multiflorum Thunb., Fallopia multiflora (Thunb.) K. Haraldson	knoopkruid	renouée à fleurs multiples	wortel, stengel, zaad	racine, tige, graine		
Rhamnus alpina L.	Rhamnaceae		alpenwegedoorn	nerprun des alpes	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en équivalentes glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rhamnus cathartica L.	Rhamnaceae		wegedoorn	nerprun purgatif	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden*	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides

						(uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	totaux* (exprimés en équivalentes glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum australe D. Don	Polygonaceae	Rheum emodii Wall. ex Meisn.		blad, wortelstok	feuille, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. Het gehalte aan rhabonticosiden moet bepaald worden. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. La teneur en rhabonticosides doit être déterminée. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas

							toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum x hybridum Murray	Polygonaceae		Tuinrabarber	rhubarbe	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum officinale Baill.	Polygonaceae		chinese rabarber	rhubarbe de chine, racine de rhubarbe officinale	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden*	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes

							(uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum palmatum L.	Polygonaceae		chinese rabarber, sierrabarber, turkse rabarber	rhubarbe de chine, rhubarbe palmée, rhubarbe décorative	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoloïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoloïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de

							arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum rhabarbarum L.	Polygonaceae	Rheum undulatum L.	rabarber	rhubarbe des jardins	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum rhabonticum L.	Polygonaceae				wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent

							beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rhodiola crenulata (Hook. f. & Thomson) Ohba	Crassulaceae		rozewortel	orpин rose	wortel	racine		
Ribes nigrum L.	Grossulariaceae		zwarte aalbes	groseillier noir, cassis, cassissier	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille		
Ribes rubrum L.	Grossulariaceae		aalbes, trosbes	groseillier à grappes	vrucht, blad	fruit, feuille		
Ribes uva-crispa L.	Grossulariaceae		kruisbes	groseillier épineux, grosseillier à maquereau	vrucht, blad	fruit, feuille		
Robinia pseudoacacia L.	Leguminosae		gewone robinia, valse acacia	robinier faux-acacia	gekookte bloem, gekookte zaad	fleur cuite, graine cuite		
Roccella phycopsis Ach.	Roccellaceae	Roccella tinctoria DC.			thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.

Rosa canina L.	Rosaceae		hondsroos	rosier des chiens, eglantier commun	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit,feuille, graine		
Rosa x centifolia L. (pro sp.)	Rosaceae		franse provenceroos, provenceroos	rosier cent-feuilles, rose pâle	bloem, blad	fleur, feuille		
Rosa gallica L.	Rosaceae		franse roos	rosier de france, rosier de provins	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit,feuille, graine		
Rosa moschata Mill.	Rosaceae		echte muskusroos	rosier musqué	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit,feuille, graine		
Rosa rubiginosa L.	Rosaceae		egelantier	rosier rouillé, rosier rubigineux, rosier églantier	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit,feuille		
Rosa x damascena Mill.	Rosaceae	Rosa gallica f. trigintipetala Dieck	damastroos	rosiers de damas	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit,feuille		
Rosmarinus officinalis L.	Lamiaceae		rozemarijn	romarin	bovengrondse delen	parties aériennes		
Rubia cordifolia L.	Rubiaceae		rubia cordifolia l.	rubiaceae	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lucidine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de lucidine.
Rubus caesius L.	Rosaceae		dauwbraam	ronce bleue	bovengrondse delen	parties aériennes		
Rubus chingii var. suavissimus (S. Lee) L.T. Lu	Rosaceae	Rubus suavissimus S. Lee			vrucht	fruit		
Rubus fruticosus L.	Rosaceae		gewone braam	ronce commune, ronce des buissons, murier sauvage	hele plant	plante entièr		
Rubus idaeus L.	Rosaceae		gewone framboos	framboisier commun, framboisier	blad, vrucht	feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Rubus rosa L.H. Bailey	Rosaceae				blad, vrucht	feuille, fruit		
Rumex acetosa L.	Polygonaceae		veldzuring	oseille sauvage, oseille des prés,	hele plant	plante entièr	De aanbevolen dagelijkse	La portion journalière

				oseille, oseille commune			hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex acetosella L.	Polygonaceae		schapenzuring	petite oseille	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux

							kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex alpinus L.	Polygonaceae		alpenzuring	oseille des alpes	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex conglomeratus Murray	Polygonaceae	Rumex acutus Sm.	kluwenzuring	patience agglomérée	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés

							rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex crispus L.	Polygonaceae		krulzuring	patience crêpue, churelle	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou

							Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex longifolius DC.	Polygonaceae			hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.	
Rumex obtusifolius L.	Polygonaceae		ridderzuring	patience à feuilles obtuses, patience sauvage, rumex à feuilles obtuses	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles

							voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex patientia L.	Polygonaceae		spinaziezuring	patience des moines, oseille épinard	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex sanguineus L.	Polygonaceae		bloedzuring		hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae		stekelige muizendoorn	fragon, petit houx	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Ruscus hypoglossum L.	Asparagaceae				cladode, wortelstok	cladode, rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Sabatia angularis (L.) Pursh	Gentianaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Saccharina latissima (L.) C.E.Lane,	Laminariaceae	Laminaria saccharina (L.) J.V. Lam.	suikerwier	laminaire sucrée, baudrier de neptune	thallus	thallus		

C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders								
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Poaceae		suikerriet	canne à sucre	tak, sap	branche, jus		
<i>Salix alba</i> L.	Salicaceae		schietwilg, knotwilg	saule blanc	schors, knop, bloem, blad	écorce, bourgeon, fleur, feuille	<p>De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :</p> <p>Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.</p>	<p>La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants :</p> <p>Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.</p>
<i>Salix caprea</i> L.	Salicaceae		boswilg	saule marsault, saule des chèvres, marsaule, marseau	schors	écorce	<p>De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :</p> <p>Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.</p>	<p>La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants :</p> <p>Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et</p>

								adolescents de moins de 18 ans.
<i>Salix fragilis</i> L.	Salicaceae		kraakwilg	saule, fragile, saule cassant	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
<i>Salix pentandra</i> L.	Salicaceae		laurierwilg	saule laurier, saule à cinq étamines	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.

<i>Salix purpurea</i> L.	Salicaceae		bittere wilg	osier rouge, saule pourpre	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
<i>Salvia hispanica</i> L.	Lamiaceae		chia	chia	olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge	Lamiaceae		rode salie	sauge de chine	blad, wortel	feuille, racine		
<i>Salvia officinalis</i> L.	Lamiaceae		echte salie	sauge officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i> (Vahl) Gams	Lamiaceae	<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl	lavendelsalie	sauge à feuilles de lavande	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Salvia pratensis</i> L.	Lamiaceae		veldsalie, weidesalie	sauge commune, sauge des prés	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Salvia sclarea</i> L.	Lamiaceae		scharlei	sauge scalarée	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Sambucus nigra</i> L.	Adoxaceae		gewone vlier	sureau noir, sureau commun	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Rosaceae		kleine pimpernel	petite pimprenelle	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Rosaceae		grote pimpernel	sanguisorbe officinale, grande pimprenelle	hele plant	plante entière		
<i>Sanicula elata</i> Buch.-Ham. ex D. Don	Apiaceae	<i>Sanicula europaea</i> L.	heelkruid	sanicle, sanicle d'europe	blad, wortel	feuille, racine		
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Asteraceae		heiligenbloem	santale petit cyprès	bloeiende top, blad, zaad	sommité fleurie, feuille, graine		
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Caryophyllaceae		zeepkruid	saponaire officinale	hele plant	plante entière		
<i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk	Apiaceae	<i>Siler divaricatum</i> (Turcz.) Benth. & Hook. f.		racine de silère	wortel	racine		
<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	Rosaceae	<i>Poterium spinosum</i> L.		racine de silère	wortelschors	écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Sargassum fusiforme</i> (Harvey) Setchell	Sargassaceae	<i>Hizikia fusiformis</i> (Harvey) Okamura	hijiki, hiziki	hijiki, hiziki	thallus	thallus		

<i>Sarracenia purpurea</i> L.	Sarraceniaceae		paarse trompetbekerplant	sarracénie pourpre	blad, wortelstok	feuille, rhizome		
<i>Satureja hortensis</i> L.	Lamiaceae		bonekruid	sarriette commune, sarriette, sarriette des jardins	bloeiende top, zaad	sommité fleurie, graine		
<i>Satureja montana</i> L.	Lamiaceae		winterbonenkruid, bergbonekruid, bergsteentijm	sarriette des montagnes, sarriette vivace	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Satureja thymbra</i> L.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Saussurea costus</i> (Falc.) Lipsch.	Asteraceae	Saussurea lappa (Decne.) Sch. Bip.	costus	costus	wortel	racine		
<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	Schisandraceae		schisandra, wu wei zu	schisandra de chine	decoc van tak, gekookt jong blad, vrucht	décoction de branche, jeune feuille cuite, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Schizochytrium microalgae</i>	Thraustochytriac eae				olie	huile	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Compositae		grote schorseneer	scorsonère d'espagne	wortel	racine		
<i>Scrophularia ningpoensis</i> Helmsl.	Scrophulariaceae		zwart helmkruid	scrophularia ningpoensis helmsl.	wortel	racine		
<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	Lamiaceae		baikalglidkruid	scutellaire du lac baïkal	blad, wortel	feuille, racine		
<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	Lamiaceae				hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune

							hoeveelheden furano neoclerodanen bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	quantité détectable en furano néo-clérodanes. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Secale cereale L.	Poaceae		rogge	seigle	hele plant	plante entière		
Sedum acre L.	Crassulaceae		muurpeper	orpин аcre	bovengrondse delen	parties aériennes		
Sedum album L.	Crassulaceae		wit vetkruid	orpин blanc, sédum blanc	blad	feuille		
Sedum roseum (L.) Scop.	Crassulaceae	Rhodiola rosea L.	rozenwortel	rhadiole rose, orpin rose	wortel	racine		
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose	Cactaceae	Cereus grandiflorus (L.) Mill.	koningin der nacht	reine de la nuit	bloem	fleur	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden narcissine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en narcissine.
Sempervivum tectorum L.	Crassulaceae		gewone huislook	joubarbe des toits, barbe de jupiter	bovengrondse delen	parties aériennes		
Senna alexandrina Mill.	Leguminosae	Cassia acutifolia Delile, Cassia alexandrina (Garsault) Thell., Cassia angustifolia M.Vahl , Cassia senna L., Senna acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandrina Garsault, Senna angustifolia (Vahl) Batka.	alexandrijnse senna	séné d'alexandrie	blad, peul	feuille, gousse	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas

							toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna italica Mill.	Leguminosae	Cassia italica (Mill.) F.W.Andrews		vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.	
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Cassia obtusifolia L.		hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden*	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes	

							(uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna occidentalis (L.) Link	Leguminosae			faux kinkéliba, café-nègre, café puant, café bâtarde, casse-puante	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoloïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoloïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de

							arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna tora (L.) Roxb.	Leguminosae			blad, zaad	feuille, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.	
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz	Taxodiaceae		mammoetboom	séquoia géant	jonge bebladerde scheuten	jeunes pousses feuillées	Enkel geglycerineerde koude maceraten zijn toegelaten waarvoor de aanbevolen dagelijkse dosis overeenstemt met maximum 41 mg equivalent droge plant.	Seuls sont autorisés les macérats froids glycérinés pour lesquels la dose journalière recommandée correspond à maximum 41 mg d'équivalent plante sèche.

<i>Serenoa repens</i> (W.Bartram) Small	Arecaceae	Serenoa serrulata (Michx.) G. Nicholson ; Serenoa serrulata (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks.; Sabal serrulata (Michx.) Schult.f.	zaagpalm, zaagpalmetto	sabal, palmier de floride, chou palmiste, palmier d'amérique du nord	vrucht	fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van vetoplosbare bestanddelen hoger dan 256 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de constituants liposolubles supérieure à 256 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin ou pharmacien.
<i>Sesamum indicum</i> L.	Pedaliaceae	<i>Sesamum</i> orientale L.	sesam	sésame	zaad	graine		
<i>Seseli tortuosum</i> L.	Apiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sideritis syriaca</i> L.	Lamiaceae		bergthee	Thé Grec des Montagnes	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sigesbeckia</i> orientalis L.	Compositae	<i>Sigesbeckia</i> serrata DC.		herbe grasse, herbe divine, herbe saint- paul	blad, wortel	feuille, racine		
<i>Silaum silaus</i> (L.) Shinz Et Thell.	Apiaceae		weidekervel	silaüs des prés	vrucht, wortel	fruit, racine		
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Compositae		mariadistel	chardon-marie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Simmondsia</i> chinensis (Link) C.K. Schneid.	Simmondsiaceae		jojoba	jojoba	zaad vrij van olie	graine sans huile	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij kinderen, adolescenten onder 18 jaar en tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans, ni durant la grossesse.
<i>Sisymbrium</i> officinale (L.) Scop.	Brassicaceae	<i>Erysimum</i> officinale L.	gewone raket	sisymbre officinal, herbe aux chantres, vêlar	bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden cardioactieve	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en glycosides

							steroïde glycoside bevat.	stéroïdes cardiotoniques.
<i>Smilax aristolochiifolia</i> Mill.	Smilacaceae	<i>Smilax medica</i> Schltdl. et Cham.			wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilacaceae		struikwinde,stekende winde	salsepareille d'europe	wortelstok, wortel, wortelscheut	rhizome, racine, pousse de racine		
<i>Smilax china</i> L.	Smilacaceae		chinawortel	squine	hele plant	plante entièbre		
<i>Smilax cordifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Smilacaceae				wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax glabra</i> Roxb.	Smilacaceae				wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax officinalis</i> Kunth	Smilacaceae	<i>Smilax</i> <i>tonduzii</i> Apt	echte sarsaparilla	salsepareille	wortel	racine		
<i>Smilax purhampuy</i> Ruiz	Smilacaceae	<i>Smilax</i> <i>febrifuga</i> Kunth	ecuadoriaanse sarsaparilla	smilax febrifuga kunth	wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax regelii</i> Killip & C.V. Morton	Smilacaceae		hondurese sarsaparilla, jamaicaanse sarsaparilla	salsepareille, salsepareille du honduras	wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Solanum melongena</i> L.	Solanaceae	<i>Solanum</i> <i>ovigerum</i> Dun.	aubergine	aubergine	vrucht, wortel	fruit, racine		
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Solanaceae		aardappel	pomme de terre	knol	tubercule		
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Compositae		echte guldenroede	solidage verge d'or	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Rosaceae		wilde lijsterbes	sorbier des oiseleurs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Poaceae		kafferkoren, durra, kafir	sorgho commun	zaad, jonge scheut	graine, jeune pousse	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.

<i>Spatholobus suberectus</i> Dunn.	Leguminosae				stam	tige	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C. Presl.	Caryophyllaceae		rode schijnspurrie	spergulaire rouge	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Amaranthaceae		spinazie	epinard	blad	feuille		
<i>Spirulina major</i> Kützing ex Gomont	Pseudanabaenaceae	<i>Spirulina major</i> Kützing	spirulina	spiruline	éencellige alg	algue unicellulaire		
<i>Spirulina maxima</i> (Setchell & Gardner) Geitler	Pseudanabaenaceae	<i>Arthrospira maxima</i> Setchell & Gardner	spirulina	spiruline	éencellige alg	algue unicellulaire		
<i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler	Pseudanabaenaceae		<i>spirulina platensis</i> , <i>platensis</i>	<i>spirulina platensis</i> , <i>platensis</i> , <i>spiruline</i> , algue de vie	éencellige alg	algue unicellulaire		
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Lamiaceae	<i>Betonica officinalis</i> L.	betonie	bétoine	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Stachys recta</i> L.	Lamiaceae		bergandoorn	épiaire droite	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Lamiaceae		bosandoorn	épiaire des bois, ortie puante	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Caryophyllaceae		vogelmuur	stellaire intermédiaire, morgeline	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Stemmacantha carthamoides</i> (Willd.) Dittrich	Asteraceae	<i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd.) Iljin		rhapontique des alpes	wortel	racine		
<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	Leguminosae	<i>Sophora japonica</i> L.	honingboom	sophora du japon	gekookt jong blad, bloem, bloemknop, decoct van het zaad, decoct van de stengel	jeune feuille cuite, fleur, bouton floral décoction de la graine, décoction de la tige	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloïden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
<i>Symplocos racemosa</i> Roxb.	Symplocaceae				bast	liber		
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Oleaceae		sering	lilas commun, lilas français	bladknop	bourgeon de feuille		
<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et L.M. Perry	Myrtaceae	<i>Caryophyllus aromaticus</i> L., <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. (nom. illeg.) Mansfeld	kruidnagelboom	girofle, giroflier, géroflier	bloemknop	bourgeon de fleur		
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	Myrtaceae		jambolan	jamblon, jamelonier	schors, vrucht, blad, zaad	écorce, fruit, feuille, graine		
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	Myrtaceae		rozenappel	jamrosat, jambrosade, jambosier, jam-rose, pomme rose	vrucht, blad	fruit, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry.	Myrtaceae		djamboe bol, maleisische rozenappel, maleisische wasappel	jambosier rouge	blad	feuille		
<i>Tagetes erecta</i> L.	Compositae		groot afrikaantje	rose d'inde	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Tagetes minuta</i> L.	Compositae		geelgroen afrikaantje	tagète des décombres	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tamarindus indica</i> L.	Leguminosae		tamarindeboom	tamarinier	vrucht	fruit		
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricaceae		franse tamarisk	tamaris commun, tamaris de france, tamarix commun, tamarix de france	jonge bladscheut	jeunes pousses		
<i>Tanacetum balsamita</i> L.	Compositae		balsemwormkruid	menthe-coq	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Compositae		moederkruid	grande camomille	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Compositae		boerenwormkruid	tanaisie vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> Web.	paardebloem	pissenlit, dent de lion	hele plant	plante entière		
<i>Terminalia bellerica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae		bibhitaki, bastaard myrobalaan	bibhitaki	vrucht	fruit		
<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Combretaceae		zwarte myrobalaan	badamier chebule, myrobalan chebule	vrucht	fruit		
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Ranunculaceae		poelruit	pigamon	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
<i>Theobroma cacao</i> L.	Malvaceae		cacaoboom	cacaoyer	zaad	graine		
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Brassicaceae		witte krodde, boerenkers	tabouret des champs, monnoyère	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire

							inname hoger dan 20 mg progoitriine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	à une ingestion de progoitriine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Thymus satureioides</i> Coss.	Lamiaceae		satureja tijm	thym saturéioïde	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Thymus serpyllum</i> L.	Lamiaceae		wilde tijm, veldtijm, citroentijm	serpolet à feuilles étroites, piolet, thym sauvage, thym rouge	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Lamiaceae		echte tijm, hooitijm, roomse kwendel, tijmoe	thym commun, thym vrai, pouilleux, frigouille	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 4 g gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 4 g de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de

							Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
<i>Thymus zygis</i> L.	Lamiaceae		spaanse tijm, rode tijm	thym d'espagne, thym rouge	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tilia americana</i> L.	Malvaceae		amerikaanse linde	tilleul d'amérique	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Malvaceae		winterlinde, kleinbladige linde	tilleul à petites feuilles, tilleul des bois, tilleul à feuilles en cœur	hele plant	plante entière		
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Malvaceae		zomerlinde, grootbladige linde	tilleul à larges feuilles	hele plant	plante entière		
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Malvaceae	<i>Tilia argentea</i> DC.	zilverlinde	tilleul argenté	hele plant	plante entière		
<i>Tilia x europaea</i> L.	Malvaceae	<i>Tilia x vulgaris</i> B. Heyne	hollandse linde	tilleul de hollandse, tilleul commun	schors, bloem, blad, zaad	écorce, fleur, feuille, graine		
<i>Tinospora sinensis</i> (Lour.) Merr.	Menispermaceae	<i>Tinospora cordifolia</i> (Willd.) Miers			wortel, stengel, blad	racine, tige, feuille		
<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Apiaceae		ajowan	ajowan	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	Compositae		paarse morgenster, boksbaard	salsifis cultivé	wortel	racine		
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Zygophyllaceae		tribulus	croix-de-malte, tribule terrestre	gekookte plantendelen van de hele plant	parties de plantes cuites de la plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van saponinen hoger dan 15 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de saponines supérieure à 15 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre

							of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling of antidiabetische behandeling. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 21 jaar.	médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension ou le diabète. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 21 ans.
Trichilia catigua A. Juss.	Meliaceae		catuaba	catuaba	schors	écorce	Een gedetailleerde botanische identificatie is vereist. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden tropaan alkaloiden bevat.	Une identification botanique détaillée est requise. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes tropaniques.
Trichosanthes kirilowii Maxim.	Cucurbitaceae		chinese komkommer	concombre chinois	vrucht (pericarp en zaad)	fruit (péridarpe et graine)	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden trichosanthine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en trichosanthine.
Tridax procumbens L.	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Trifolium arvense L.	Leguminosae		hazelpootje	pied-de-lièvre, trèfle des champs, trèfle	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en

							glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trifolium campestre Schreb.	Leguminosae		liggende klaver	trèfle des champs	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trifolium pratense L.	Leguminosae		rode klaver	trèfle des prés, trèfle rouge, triolet	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trifolium repens L.	Leguminosae		witte klaver	trèfle rampant, trèfle blanc, coucou	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion

							isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	Leguminosae		zevengetijdeklaver	trigonelle bleue	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Leguminosae		fenegriek	fenugrec	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Trillium erectum</i> L.	Melanthiaceae		drieblad, boslelie	trille rouge, trille dressé	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Triticum aestivum</i> L.	Poaceae	<i>Triticum vulgare</i> Vill. ; <i>Triticum sativum</i> Lam.	gewone tarwe	blé commun, froment	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Triticum dicoccum</i> (Schrank.) Schübl.	Poaceae		emmertarwe, emmer, tweekoren	amidonnier	vrucht	fruit		
<i>Triticum durum</i> Desf.	Poaceae	<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husnot	harde tarwe	froment dur	scheut, zaad	pousse, graine		
<i>Triticum spelta</i> L.	Poaceae		spelt	épeautre	scheut, zaad	pousse, graine		
<i>Triticum turgidum</i> L.	Poaceae		engelse tarwe	blé barbu, gros blé	scheut, zaad	pousse, graine		

Tropaeolum majus L.	Tropaeolaceae		oost-indische kers	grande capucine	bovengrondse delen zonder vrucht	parties aériennes sans fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyreïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Tropaeolum minus L.	Tropaeolaceae				bovengrondse delen zonder vrucht	parties aériennes sans fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreïdie of onder schildklier	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyreïdie ou ayant un

							behandeling, uw arts raadplegen.	traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Pinaceae		oostelijke, canadese hemlockspar	pruche du canada, pruche de l'est	blad, hars	feuille, résine		
<i>Turnera diffusa</i> Wild. ex Schult.	Passifloraceae		damiaanblad, damiana	feuilles de damiana, turnéra	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulmaceae	<i>Ulmus campestris</i> L.; <i>Ulmus scabra</i> Mill.	ruwe olm, ruwe iep, bergiep	orme des montagnes, orme rude, orme blanc	schors, knop	écorce, bourgeon		
<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulmaceae		siberische iep	orme de sibérie	schors, blad	écorce, feuille		
<i>Ulmus rubra</i> Muhl.	Ulmaceae	<i>Ulmus fulva</i> Michx.	rode iep	orme rouge	schors	écorce		
<i>Ulva lactuca</i> L.	Ulvaceae		zeesla	laitue de mer	thallus	thallus		
<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.	Rubiaceae		cachou, gambir, gambirstruik	cachou gambir, arbre catechu	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.	Rubiaceae	<i>Nauclea rhynchophylla</i> Miq.			haak	<b>crochet</b>		
<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC.	Rubiaceae		katsklauw	griffe de chat	schors, stam, wortel	écorce, tige, racine		
<i>Undaria pinnatifida</i> (Harvey) Suringar	Alariaceae	<i>Alaria pinnatifida</i> Harvey	wakame	wakamé	thallus	thallus		
<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae		grote brandnetel	ortie dioïque, grande ortie	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome: La portion

							dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.
<i>Urtica urens</i> L.	Urticaceae		kleine brandnetel	ortie brûlante, petite ortie	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.
<i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Parmeliaceae		baardmos	usnée, barbe de saint-antoine, barbe de jupiter	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en

							eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
<i>Usnea longissima</i> Ach.	Parmeliaceae		baardmos	usnée, mousse d'espagne	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
<i>Usnea plicata</i> Wiggers	Parmeliaceae				thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
<i>Vaccinium myrtilloïdes</i> Michx.	Ericaceae	<i>Vaccinium angustifolium</i> var. <i>myrtilloides</i> (Michx.) House		airelle fausse-myrtille, bleuet, bleuet sauvage	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Ericaceae		blauwe bes	myrtille arbustive, grande myrtille, myrtille américaine, bleuet géant, corymbole	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	Ericaceae		grote veenbes, cranberry	canneberge à gros fruits, airelle à gros fruits	bes	baie		

Vaccinium myrtillus L.	Ericaceae		blauwe bosbes	myrtille commune, myrtillier, baies de myrtille	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium oxycoccus L.	Ericaceae	Oxycoccus palustris Pers.	kleine veenbes	canneberge des marais, airelle canneberge, canneberge ou atocas	vrucht	fruit		
Vaccinium uliginosum L.	Ericaceae		ruijsbes	myrtille des marais	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium vitis-idaea L.	Ericaceae		rode bosbes	airelle, airelle vigne d'ida, airelle rouge	vrucht, blad	fruit, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 6,8 g gedroogd blad. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 6,8 g de feuille séchée. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Valeriana jatamansi Jones	Valerianaceae	Valeriana wallichii DC.	indische valeriaan	valérianie d'inde	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g gedroogde wortel. De in te nemen bereiding mag geen valepotriaten bevatten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g de racine séchée. la forme finale à consommer ne peut pas contenir de valépotriates.
Valeriana officinalis L.	Caprifoliaceae		echte valeriaan	valérianie officinale, valérianie des collines, valérianie à petites feuilles	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la

							equivalent met 3,6 g gedroogde wortel. De in te nemen bereiding mag geen valepotriaten bevatten.	quantité équivalente à 3,6 g de racine séchée. la forme finale à consommer ne peut pas contenir de valépotriates.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Caprifoliaceae	<i>Valeriana locusta</i> L.	veldsla, korensla, ezelsoor	mâche, blanchette, bourse, clairette, raiponce, oreillette, salade de blé	blad	feuille		
<i>Vanilla planifolia</i> Jacks. ex Andrews	Orchidaceae		vanille-orchidee	vanille	vrucht, olijehars	fruit, oléorésine		
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Scrophulariaceae		stalkaars	bouillon blanc à grandes fleurs, molène à fleurs denses, bonhomme, molène	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Scrophulariaceae		keizerskaars	molène faux-phlomis	bloem	fleur		
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Scrophulariaceae		koningskaars	bouillon blanc à petites fleurs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbenaceae		ijzerhard	verveine sauvage, verveine officinale	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Plantaginaceae		blauwe waterereprijs	véronique mouron d'eau, mouron aquatique	hele plant	plante entière		
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Plantaginaceae		beekpunge	véronique des ruisseaux, cresson de cheval, salade de chouette	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Plantaginaceae		gewone ereprijs, gamander-ereprijs	véronique petit-chêne, fausse germandrée	hele plant	plante entière		
<i>Veronica officinalis</i> L.	Plantaginaceae		mannetjesereprijs	véronique officinale, thé d'europe	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viburnum lantana</i> L.	Adoxaceae		wollige sneeuwbal	viorne mancienne, viorne lantane, mansienne	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Viburnum opulus L.</i>	Adoxaceae		gelderse roos	viorne obier, boule-de-neige	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Vicia faba L.</i>	Leguminosae		tuinboon, labboon	fèves, féverolles	gekookt zaad	graine cuite	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij favisme.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de favisme.
<i>Vigna angularis (Willd.) Ohwi &amp; H. Ohashi</i>	Leguminosae	<i>Phaseolus chrysanthos Savi</i>	adzukiboon	haricot azuki	gekookt of geweekt zaad	graine cuite ou trempée		
<i>Viola calcarata L.</i>	Violaceae		langsporig viooltje	pensée des alpes	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viola odorata L.</i>	Violaceae		maarts viooltje	violette odorante	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viola palustris L.</i>	Violaceae		moerasviooltje	violette des marais	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viola tricolor L.</i>	Violaceae		driekleurig viooltje	pensée sauvage, violette tricolore des jardins, pensée tricolore	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viscum album L.</i>	Santalaceae		maretak	gui	tak, blad	branche, feuille		
<i>Vitex agnus-castus L.</i>	Lamiaceae		monnikenpeper, kuisboom	gatillier, agneau-chaste	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 96 mg gedroogde vrucht. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de fruit: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 96 mg de fruit séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Vitex trifolia L.	Lamiaceae				vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding..	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Vitis vinifera L.	Vitis Vitaceae		druif, wijnstok, wijngaardstok	vigne cultivée, vigne vinifère	vrucht, bladknop, blad, zaad	fruit, bourgeon de feuille, feuille, graine		
Withania somnifera (L.) Dunal	Solanaceae		ashwagandha, indiase ginseng	ashwagandha, ginseng indien	hele plant	plante entière		
Xeranthemum annuum L.	Compositae		papierbloem	immortelle	bloem	fleur		
Yucca filamentosa L.	Asparagaceae		palmlelie	yucca filamenteux	bovengrondse delen	parties aériennes		
Yucca schidigera Roezl ex Ortgies	Asparagaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Zea mays L.	Poaceae		maïs	maïs	bloem, vrucht, haarwortels van gekiemde zaad	fleur, fruit, radicelles de graine germée		
Zingiber officinale Rosc.	Zingiberaceae		gember	gingembre, amome des indes	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 1,5 g gedroogde wortelstok voor adolescenten en volwassenen en de hoeveelheid equivalent met 0,75 g gedroogde wortelstok voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 1,5 g de rhizome séché pour adolescents et adultes et à la quantité équivalente à 0,75 g de rhizome séché pour les enfants de 6 à 12 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire

							niet leiden tot een inname hoger dan 1 g gedroogde wortelstok voor zwangere vrouwen (extracten zijn niet toegelaten). Het gebruik voor kinderen onder 6 jaar is niet toegestaan.	à une ingestion supérieure à 1 g de rhizome séché pour les femmes enceintes (les extraits ne sont pas autorisés). L'utilisation pour les enfants de moins de 6 ans n'est pas autorisée.
Ziziphus jujuba Mill.	Rhamnaceae		jujubeboom, chinese dadel	jujubier, dattier chinois	bovengrondse delen	parties aériennes		

\* Pour calculer la teneur "totale" en anthranoïdes, il faut déterminer les teneurs de chaque composant séparément et ensuite, en fonction des dosages administrés, en faire la somme. Pour les mélanges de différentes espèces de plantes, la teneur totale est limitée à la dose maximale autorisée de l'ingrédient auquel s'applique la dose la plus faible en cas d'utilisation simple.