

Codeeradviezen

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering

Publicatie mei 2016 (deel 3)

Inhoudsopgave FAQ's ICD-10-BE

Publicatie mei 2016 (deel 3); registratiejaar 2015

- Hfdst 2 - Inleiding tot de ICD-10-CM classificatie (1 vraag)
- Hfdst 9 - Basisstappen van de ICD-10-PCS codering (1 vraag)
- Hfdst 13 - Symptomen, ziekte tekens en slecht omschreven aandoeningen (2 vragen)
- Hfdst 16 - Mentale aandoeningen (1 vraag)
- Hfdst 19 - Ziekten van het respiratoir stelsel (1 vraag)
- Hfdst 20 - Ziekten van het gastro-intestinaal stelsel (4 vragen)
- Hfdst 21 - Aandoeningen van het urogenitaal stelsel (4 vragen)
- Hfdst 23 - Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en het bindweefsel (3 vragen)
- Hfdst 24 - Complicaties van zwangerschap, bevalling en puerperium (1 vraag)
- Hfdst 27 - Perinatale aandoeningen (1 vraag)
- Hfdst 33 - Complicaties van chirurgische en medische zorg (1 vraag)

INLEIDING

In deze publicatie werden de door de ziekenhuizen gestelde ICD-10-BE codeervragen beantwoord. De antwoorden hebben enkel betrekking op de in de vragen beschreven codeerproblemen. De antwoorden op deze vragen mogen niet in andere contexten gebruikt worden. De codeervragen werden gegroepeerd in dezelfde volgorde van de hoofdstukken van het ICD-10-BE handboek (v1.5).

Referentie:

Handboek ICD-10-BE codering (v1.5)

Het ICD-10-BE codeerhandboek is de enige officiële referentie voor de ICD-10-BE codering in België.

Hfdst 2 - Inleiding tot de ICD-10-CM classificatie

Vraag 1

Differentiaaldiagnosen: in de richtlijnen staat dat indien er meerdere gelijkaardige of differentiaaldiagnosen gedocumenteerd worden als mogelijke of vermoedelijke diagnoses, deze gecodeerd mogen worden alsof ze bevestigd zijn. Moeten deze differentiaaldiagnosen dan met de zekerheidsgraad (2): zeker of (1): mogelijk gecodeerd worden?

Deze differentiaaldiagnosen worden gecodeerd met de zekerheidsgraad (1): mogelijk.

Hfdst 9 - Basisstappen van de ICD-10-PCS codering

Vraag 1

Algemene vraag: Moeten de exclude's van ICD-9 toegepast worden op de procedures van ICD-10?

De Exclude's van ICD-9 bij de procedures worden niet toegepast op de procedures in ICD-10.

Hfdst 13 - Symptomen, ziektekenen en slecht omschreven aandoeningen

Vraag 1

Mag een syncope gecodeerd worden, ook al is de oorzaak van de syncope gekend?

Een symptoom mag gecodeerd worden indien het voldoet aan de criteria voor het coderen van symptomen (zie handboek). Uiteraard hangt dit af van de concrete omstandigheden van het verblijf.

Vraag 2

Hoe kunnen we acetonemisch braken coderen?

Dit wordt gecodeerd met R11.10 'Vomiting unspecified' en R79.89 'Other specified abnormal findings of blood chemistry'.

Hfdst 16 - Mentale aandoeningen

Vraag 1

Hoe moeten wij multifactoriële dementie coderen in ICD-10-BE?

Indien de oorzaken van de multifactoriële dementie vermeld worden mogen die gecodeerd worden, indien niet wordt F03.-- (zie index: 'Dementia in multiple etiologies') gecodeerd.

Hfdst 19 - Ziekten van het respiratoir stelsel

Vraag 1

Hoe moet men bronchiale hyperreactiviteit, zonder tekens van astma coderen? J39.3?

J39.3 verwijst naar 'Upper respiratory tract hypersensitivity reaction, site unspecified' maar de bronchieën behoren niet tot 'upper respiratory tract'.

Bronchiale hyperreactiviteit wordt niet gecodeerd indien deze deel uitmaakt van een onderliggende respiratoire pathologie.

Uitzonderlijk kan deze hyperreactiviteit gecodeerd worden (indien dit relevant is voor de opname) met een symptoomcode afhankelijk van de context:

- R06.89: other abnormalities of breathing
- R09.89: Other specified symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems
-

Hfdst 20 - Ziekten van het gastro-intestinaal stelsel

Vraag 1

Een patiënt opgenomen voor het sluiten van een colostomie wordt nadien getransfereerd naar intensieve zorgen omwille van een acuut abdomen. Een exploratieve laparoscopie toont een blown out van het terminaal ileum op basis van een obstructie door een briden. Dit wordt als hoofddiagnose voor het specialisme intensieve zorgen gecodeerd. Moet hier nog een Z-code voor aftercare worden toegevoegd als nevendiagnose?

Een code voor aftercare mag in dit geval gecodeerd worden als nevendiagnose op intensieve zorgen.

Vraag 2

Moet bij het coderen van alcoholisch coma met massieve ascites secundair op Laennec cirrose bij chronisch alcoholisme naast de code K70.41 'Alcoholic hepatic failure with coma' ook de code K70.31 'Alcoholic cirrhosis of liver with ascites' worden toegevoegd?

Inderdaad de code K70.31 'Alcoholic cirrhosis of liver with ascites' dient toegevoegd te worden.

Vraag 3

Bloedende gastro-intestinale tumor. Moeten we de bloeding apart bij coderen omdat er geen combinatiecode beschikbaar is of is de bloeding inherent aan de tumor?

Ja de bloeding wordt apart bij gecodeerd indien er geen combinatiecode bestaat en er geen 'Exclude 1' voor bloeding aanwezig is.

Vraag 4

Hoe coderen we acute leverstuwung bij bv. rechter hartfalen?

De onderliggende oorzaak van de leverstuwung moet gecodeerd worden namelijk het rechter hartfalen, de leverstuwung maakt hier integraal deel van uit.

Hfdst 21 - Aandoeningen van het urogenitaal stelsel

Vraag 1

Welke 'body part' ('urethra' of 'bladder neck') wordt gecodeerd bij een TVT voor stressincontinentie bij een vrouw en wordt dit uitgevoerd via een open approach?

Dit wordt gecodeerd in de tabel OTU met "body part" "urethra". De gebruikte "approach" dient nagevraagd te worden bij de behandelende arts.

Vraag 2

Hoe wordt een verworven 'concealed penis' met een verworven PUJ stenose gecodeerd?

De code voor verworven 'concealed penis' is N48.83 'Acquired buried penis'. De verworven PUJ stenose wordt gecodeerd aan de hand van de onderliggende oorzaak.

Vraag 3

Nierbiopsie onder echografie: moet de echografie erbij gecodeerd worden?

De echografie in dit geval moet er niet bij gecodeerd worden maar het mag wel.

Vraag 4

Moet het plaatsen van een blaassonde, bijvoorbeeld bij een patiënt met urineretentie, bij gecodeerd worden?

Dit wordt gecodeerd met 0T9B70Z 'Drainage of Bladder with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening', het plaatsen (insertion) van de blaassonde wordt niet apart bij gecodeerd.

Hfdst 23 - Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en het bindweefsel

Vraag 1

Coderen we een bunionette van de 5de metatarsaal rechter voet als een toe deformity M20.5X1?

Dit wordt gecodeerd met M20.5X1 'Other deformities of toe(s) (acquired), right foot'.

Vraag 2

Geldt de regel van ICD 9 dat Spinale stenose zonder neurogene claudicatio (ICD 9: 724.02) (ICD 10 M48.0-) enkel met deze code mag gecodeerd worden in afwezigheid van een gediagnosticeerde etiologie?

Inderdaad M48.0- 'Spinal stenosis' wordt gecodeerd in het geval van een spinale stenose zonder neurogene claudicatio wanneer deze voldoet aan de criteria voor het coderen van nevendiagnosen en in afwezigheid van een gediagnosticeerde etiologie.

Vraag 3

Hoe coderen we de injectie van geconcentreerde bloedplaatjes in de Achillespees? Welk 'body system' wordt gebruikt?

Dit wordt gecodeerd met 3E023GC 'Introduction of Other Therapeutic Substance into Muscle, Percutaneous Approach'.

Hfdst 24 - Complicaties van zwangerschap, bevalling en puerperium

Vraag 1

Zwangere opgenomen op 36 weken en bevallen op 37 weken. Welke code voor het aantal zwangerschapsweken moet hier gebruikt worden?

De code Z3A.36 '36 weeks gestation of pregnancy' wordt hier gebruikt.

Hfdst 27 - Perinatale aandoeningen

Vraag 1

Mogen de codes P08.21 en P08.22 altijd in het geboorteverblijf gecodeerd worden?

P08.21 'Post-term newborn' mag altijd gecodeerd worden in het geboorteverblijf indien de baby geboren is na de 40ste volledige week, maar voor het einde van de 42ste week.

P08.22 'Prolonged gestation of newborn' mag altijd gecodeerd worden in het geboorteverblijf indien de baby geboren is na de 42ste volledige week.

Hfdst 33 - Complicaties van chirurgische en medische zorg

Vraag 1

Er is een tegenstrijdigheid in de Draft PCS voor wat ECMO betreft. In de index (p. 88 vlak voor letter P) staat voor ECMO 'See Assistance' (5A0). In de PCS op p. 617 staat er voor ECMO 5A1 'Performance', net als in de BE-handleiding (5A15223).

Een ECMO wordt gecodeerd met "Performance" zoals de meest recente versie van het handboek en de index het aangeeft.